




C. xvii.

18/p

42377/B

1. —





12550
MATERIA

VENENARIA.

REGNI VEGETABILIS



AVCTORE

IOANNE GEORGIO PVIHN

MED. DOCT. ET PHYS. PROV. CVLMBACENSIS.

LIPSIAE

APVD C. G. HILSCHERVUM

clolcccclxxxv.



SERENISSIMO PRINCIPI AC DOMINO

DOMINO

CHRISTIANO FRIDERICO
CAROLO ALEXANDRO

MARGGRAVIO BRANDENBURGICO BORVS-
SIAE SILESIAE MAGDEBURGI CLIVIAE IV-
LIACI MONTIVM STETINI POMERANIAE
CASSVBIORVM ET VANDALORVM MEGAPO-
LEOS ET CROSSAE DVCI BURGGRAVIO NO-
RIMBERGENSI SUPERIORIS ATQVE INFE-
RIORIS PRINCIPATVS PRINCIPI HALBER-
STADII MINDAE CAMINAE VANDALIAE
SVERINI RACEBURGI ET MURSIAE COMI-
TI GLAZAE HOHENZOLLERAE MARCAE RA-
VENSBERGI SVERINI DYNASTAE RAVEN-
STEINII ROSTOCHII STARGARDIAE COMI-
TI SAYNAE ET WITTGENSTEINAE DO-
MINO LIMBURGI REL. REL.

CIRCVLI FRANCONICI CAPITANEO ET
SVMMO CASTRORVM PRAEFECTO AVGV-
STISSIMAE ROMANORVM IMPERATRICIS
GENERALI EXCVBIARVM MILITARIVM
PRAEFECTO POTENTISSIMI BORVSSIAE
REGIS SVPREMO BELLI LEGATO TRIVM-
QVE EQVESTRIVM LEGIONVM TRI-
BVNO REL. REL.

PRINCIPI AC DOMINO SVO
CLEMENTISSIMO

PATRIAE PATRI INDVLGENTISSIMO

THE HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY JACOB LEITCH KETCHUM
NEW YORK: PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 2ND ST.
1879

THE HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY JACOB LEITCH KETCHUM
NEW YORK: PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 2ND ST.
1879

THE HISTORY OF THE
CITY OF NEW YORK
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY JACOB LEITCH KETCHUM
NEW YORK: PUBLISHED BY
J. B. LIPPINCOTT & CO., 15 N. 2ND ST.
1879

SERENISSIME PRINCEPS,
DOMINE CLEMENTISSIME!

Studiorum primitias cui consecrarem, res longae deliberationis non fuit. Cuinam potius, quam **TIBI, SERENISSIME PRINCEPS,** cuius summis beneficiis maxime obstrictum me sentio. Sed minus est expedita quaestio, hae an dignae sint, quae tanto **PRINCIPI** offerantur? In hac ambiguitate constitutus memet ipsum temeritatis vix condonandae adcusarem, nisi cum singularis indulgentia et amor, quo ciues **TVOS** amplecti soles, tum laudatissimum institutum litterarum amorem in iisdem

inflammandi earumque studia iuuandi
spem laetam mihi facerent, TE pri-
mis diligentiae fructibus benignissime
indulturum esse. Longe sane maiori
iure reprehendendus essem, si excel-
las virtutes TVAS laudandi officium,
cui explendo non par sum, mihi su-
merem; hancce enim scriptiunculam
qualemcunque TIBI tradens non nisi
testimonium quoddam publice edere
volui animi pii, grati ac reuerentia
plenissimi, quo aeternum ero

SERENISSIMI PRINCIPIS,
DOMINI CLEMENTISSIMI

subiectissimus deuotissimusque

Auctor.

PRAEFATIO.

*A*d stupendos effectus producendos, quid efficere valeat Natura, in venenis experta esse quum videatur; facile quilibet perſpiciet, quae ſit illorum rite cognoscendorum

necessitas. Horum enim adcurata cognitio non modo a noxa, quam, nulla saepius arte reparabilem, sanitati et vitae nostrae inferunt, nos defendit; sed maximum etiam, quem medicinae, oeconomiae, technologiae cet. praebent usum, nos docet. Ast superfluum esset, quanti momenti haec naturae effecta sint, fusius demonstrare, quum summa doctissimorum virorum diligentia, quam in corpora haecce impenderunt, hoc satis testetur mihi huius negotii otium faciat. Praeter alios celeberr. i. F. GMELINVS de hoc argumento bene promeruit, utpote qui observationes aliorum et experimenta de hac re capta diligenter collegit et

con-

concinne fufeque vnacum] characteribus corporum naturalium in variis libris *) expofuit.

Quae confideranti repetita venenorum, quamquam non nifi vegetabilium perluftratio forte fuperflua videri poffet. Sed variae ad hocce molimen me adduxerunt rationes. Commodiori nimirum, quam quae G M E L I N O placuit, methodo, *Linneana* **) illa quidem, quae fimul breuitate fe commendat, venena proponi poffe arbitratus fum. Non nulla etiam G M E-

a 5

LINVS

*) Allgemeine Gefchichte der Gifte. 1776.

- - - Pflanzengifte.

- - - mineralifchen Gifte.

**) Vid. C. a Linné Mater. Medic. edit. IV. cur. I. C. D.

SCHREBER. 1782.

LINVS venenis regni vegetabilis adnumeravit innocua, vix vlllo signo suspecta; plures autem plantas, quas in venenatarum numerum recipere nullus plane dubito, quamuis aliquas illarum mortem cuidam animali intulisse hucusque nondum satis constet, omisit vir doctissimus. Variæ enim causæ huiusmodi effectum præpedire quidem, sed fortassis non semper et ubique tollere potuerunt. Tam parua dosi sæpius ingeruntur aut externe adplicantur, vel in ea valetudinis conditione et tempore, vt animalis naturæ viribus leuioribusque remediis ac euporistis facile superentur toxica. Sub coelo, inprimis calidiore, multæ proueniunt plantæ
· eaeque

caeque venenatissimae, quas mortiferos habuisse
 effectus nemo adfirmare potest, quia nimirum
 facie externa et saepe magis adhuc odore sapo-
 reque virulentiam produnt, vel virtute nociua
 famosae antiquitus ab omnibus fugiuntur. Quis
 vero praedicere audebit, eas et imposterum ne-
 minem in vitae discrimen adducturas esse? Ex
 his itaque elucet, eam ob rem plantas nondum
 a venenis excludendas esse, ideo quod illas
 mortis causam exstitisse nondum constet. Sed
 et multas celeberr. G M E L I N V S praeteriit, qua-
 rum lethales effectus cogniti sunt, quo e. g. re-
 ferrelliceat *Gratiolam officinalem*, cuius funesti
 effectus in Gallia obseruati sunt, *Crocum officina-*
nalem

nalem cet. cet. variasque nouiter demum detectas. Namque nec superfluum, nec incongruum; sed maxime consultum et proficuum duxi, vel ea huc referre, quae ut venena minus adhuc innotuerunt, dum hoc modo, teste pro dolor! experientia, eo certius inscium opprimunt, quo minus ea auersari solet. Dabam
Culmbaci mens. Octobris MDCCLXXXV.

In genere Venenum corpus dicitur, quod animum naturam in peius mutat, ea ratione, ut effectus, inde oriundi, corporis adplicati nec massae, nec externo impulsui debeantur. Secundum hanc definitionem medicamenta, sano corpori adplicata, in latiori sensu semper venena dicenda sunt, quum tanquam sanum non in melius, sed in peius potius mutari possit. Pharmakon itaque (quae ambigua vox est) non, nisi respectu aegroti corporis bonum, i. e. medicamentum nominari potest. Verum vel alimenta¹ (quae a pharmacis, corpus nutriendo, differunt) multa et varia, posita hacce veneni notione latiori, venena esse possunt. Strictiori autem sensu, missa aliarum definitionum reprehensione, id corpus venenum pronuncian- dum existimo, quod ope principii singularis, vel narcotici, vel acris, vel utriusque, vel alius
igno-

- 1) Quod quidem eo verius est, quo pluribus alimentorum instar utimur, in Materiam Medicam, aut saltem ad aromatum, quorum abusus valetudinis robur laefaciat, classem ablegandis.

ignoti², aut vi mechanica, intus adplicata, corpori animali, etiam sano, mortiferos inferre valet effectus, nec a pondere, nec a volumine intus adsumti, seu alio modo adhibiti dependentes; siue, vt breuius rem expediam: corpus, quod non mole, sed vel ingestum vi mechanica, vel varia ratione adplicatum, principio quodam singulari, ad nutritionem inepto, naturam animalem destruit, venenum est. Hac defini-

- 2) Toxica sagittaria, de quarum specie maxime notabili Illustr. SCHREBER, fautor et praeceptor omni pietatis cultu aeternum prosequendus, fusius disseruit, (vid. *Naturforsch* 19 St. p. 129.) et quae per vulnus cruentum adplicata, exceptis, quos interdum obseruare licet, motibus aliquot conuulsuis, sine magno, vt videtur, dolore, minuto temporis primo nondum elapso animalia occidunt, non amara, vrentissima, calefaciente qualitate sua, quam degustata linguae imprimunt, quae sensiliores partes illacfas inflammant, agere, persuadere mihi nequeo; etsi determinari non potest, cur horum acedo hac, neque alia ratione operetur. Verisimillimum est. vasa sanguifera per consensum neruorum, qui inter ea esse videtur, subito constringi, sicque humorum circuitum tolli. Idem consensus vascula lymphatica inter et glandulas est: vna enim glandula tumente, etiam caeterae tument; quod vt in aliis morbis, ita et vase lymphatico per instrumentum venenosum laeso accidit. Intumescunt tunc praeter partis adfectae inflammationem, febrem cet. etiam omnes glandulae. Succorum inorbofa mutatio (namque venenum huiusmodi cum sanguine tepido e vena misso mixtum cruoris a sero secessionem, atque coagulationem impedit) tam subitae necis causa esse non potest, siquidem sanguis e vasis iugularibus animalis cuiusdam toxico hocce laesi et moribundi eductus, naturaliter constitutus adparet, serumque a cruore secedit.

definitione excluduntur cum alimenta; tum medicamenta multa, inprimis minus efficacia, quae magis nutriunt et debiliora sunt, quam quae corpus nostrum, quod innumeris iniuriis impune ferendis, sat firmum construere naturam oportebat, pessumdare possent. Heroicorum autem medicamentorum numerum non paruum e Materia Medica, iam aliis praeecuntibus huc transferendum esse censeo; res enim, quae rite adhibita medicamentum est, eam ob causam non definit esse venenum, quum omnino pauca venena, absolute et per se, sed sub quibusdam tantum conditionibus, talia dici queant ³.

Est autem venenorum regni vegetabilis, seu plantarum venenatarum, quales vbilibet fere

A 2

proger-

- c) *Absolutum venenum* nominandum arbitror, quod sub quolibet conditione perimere valet. Quod iterum vel *simpliciter absolutum* (panaceae, in rerum natura non existentis, oppositum) est, vel non. Hoc aut tantum interne, aut tantum externe adplicatum absolute mortem infert; illud utroque modo. Venenum vi subtilitatis maxime penetrabilis, omnes corporis aditus perrepens, semper certe letiferum existere potest, vel vere est. Quod quidem vel ita necat, quod ob celeritatem, qua agit, maximam omne, quod ferendum est auxilium, etiam praesentaneum et conuenientissimum, serius iusto adplicetur, solae prophylaxi, profapiae toxici opposita infringendum; vel cui, nullius quoque prophylactices capaci, nullum antidotum est, aut nos saltem adhuc latens. Quaedam aëris species et animalia venenata, forte et vegetabilia huc pertinere videntur. — Plurima venena relatiua sunt.

progerminant, numerus sane non paruus, vel solum nobis cognitarum; eoque ipso, vt reliquorum Regnorum venenis vulgariora, cum primis attendi merentur, ne ignorantiae poenam luere oporteat, dum iam innumera testantur exempla, quam saepe toxicae plantae ab insciis pro salutaribus habitae, in cibum receptae, vel cum iis commistae et confusae sint.

Praeter characteres, quos Botanica nos docet, plerasque plantas venenatas etiam aliis, ab innocentibus plantis natura distinxit ingenii noxii notis, plus minusue perspicuis; in quibus tamen cognoscendis bruta, inprimis quorum indoles consortio hominis nondum mutata est, vt et populi inculti multum superant homines cultiores in ciuitatibus viuentes, in quibus sensuum aciem nimia rerum varietate et abusu infractam obseruamus. His adcedit, quod plurimi homines plantarum, quae tamen maximam alimentorum partem erogant, notitiam nimis negligant, dum alii rei herbariae magis studiosi, et forte etiam bruta, quae praecipue plantis aluntur, saepe solo habitu infidas agnoscunt. Attamen color, sapor, odor, sensatio, seu labes qua superficies corporis adficiatur, praecipua malignitatis exhibent criteria. Quam ob rem brutorum, inprimis delicatiorum (caprae cet. multas, aliis animalibus deleterias, plantas impune carpunt) actiones fidsimo saepe suspectarum plantarum indicio sunt; idque

idque eo magis, in quo pluribus eiusdem seu alius generis siue classis animalibus, auersatio illa obseruatur, quae suspitio confirmatur, si nonnulla bruta caussis quibusdam impulsæ in detrimentum suum atque perniciem herbas istas detiorarunt. Alia criteria etiam familiae et adfinitates plantarum, chemia, et loci, quo vegetant, conditio cum reliquis collata, nobis suggerunt. Nonnullorum autem vegetabilium virus tam absconditum latet, vt homines et bestiae inde saepenumero decipiantur, nec id facile, nisi institutis experimentis, manifestetur.

Vt omnino venena, sic et in specie vegetabilia (quae id cum mineralibus commune habere videntur, quod, vt regni animalis varia, non contagiosa sint,) diuidi possunt in ea, quae mixtione (haec *chemica* dicere liceat), et ea, quae vi *mechanica* agunt. *Mechanicorum* in regno minerali plurima deprehenduntur; quaedam tamen et in vegetabili, quo referatur, e. g. *Panicum pungens* (Act. Hafnienf. 1778. p. 285.) quod aristis abruptis cutique tractantis infixis eandem, ac *Dolichos pruriens* et *vrens* excitat molestiam, *Carex acuta*⁴ (sine dubio etiam aliae species), et praecipue *Phalaris arundinacea*—cet. quorum agendi modus cum illo Alu-

A 3

minis

4) Hanc pecoribus incautis vel fame pressis noxiam esse confirmat celeb. quondam apud Lipsienses Oec. et Cam. Prof. SCHREBERVS, in den *oecon. Samml.* t. XI. p. 229. et cel. BERNHARD *Abb. vom Wiesenbau* p. 225. sq.

minis plumosi conuenit. Quae *mechanica* irritando, pungendo, lacerando, pruritus, dolores, inflammationes, spasmos, haemorrhagias, capitis et sensorii communis adfectus sympathicos cet. producunt; quam vim omnem a figura particularum, duritie quadam praeditarum, modoque illas adplicandi non plane excluso, dependere, inter omnes constat. An *chemica* cum his re ipsa conueniant, et sola subtilitate differant? dictu difficile est.

Chemica (aliis *physica* dicta) mixtione sua, vel naturali (i. e. indole), vel praeternaturali, vel varie praeparata agunt. Reliquis vulgatiores sunt indole sua agentia. Praeter naturam et alimenta et pharmaca mutantur vel constitutione morbofa, vt fecale cornutum; vel putredine, qua aer mephiticus (seu modo vapor), qui etiam putridae indolis esse videtur, demum gignitur⁵⁾; (qui tunc vt aer, ad regnum minerale amandandus erit, nisi quemlibet aerem ad illud regnum referre velis, quod ad illius genesin praecipue materiam praebet,) aut principium vaporosum, quod ante iam plantae inerat, nec
aëris

- 5) Exemplo sit *Crithmum maritimum*, quod Anglis aliisque populis instar acetarii innocui est, quodue seminis ficcandi gratia vna cum caule et foliis ex parte corruptis calidae fornaci impositum spirauit aerem, qui infantibus et adultis vehementem cephalalgiam, soporem, fastidium, vomitum, animique deliquium excitauit. Vid. Cl. L. KRAVSENS *erfahrungsmässigen Unterricht von der Gärtnercy. Berlin und Leipzig 1773. p. 723.*

aëris speciebus adnumerandum videtur, expellitur. Venena, e plantis varia praeparatione educenda, sunt: resinae, gummata, olea aetherea et empyreumatica, alcohol, salia, in specie acida, concentrata, alcali fixum vegetabile causticum, camphora⁶ cet. quorum alia potissimum foris per vulnus corpus ingressa; alia intus sumta cito aut lente machinam animalem destruunt.

Chemica venena regni vegetabilis sunt vel narcotica, vel acria. Illa sunt indolis maxime volatilis et penetrabilis, qua corpus animale, quamuis saepe magna distantia ab ipsis remotum, subire valent. Plerumque odore, grato aut fastidioso, se produnt; interdum tamen omnis odoris, saltem a nobis non percipiendi, expertia⁷ corpori sese insinuant solis effectibus suis se prodentia. Et vim hancce halituosam, qua neruorum systema praecipue adficiunt, in toto regno vegetabili, cui etiam privative competere videtur, semper esse vnam eandemque, licet in diuersis plantis diuerso modo aliarum particularum interuentu et commixtione mutatam, equidem arbitror. Alia narcotica solummodo foris, e. g. florum quo-

A 4

rumdam

6) Camphorae Scrupuli duo adsumti delirium, idearum confusionem, temulentiam, debilitatem summam, convolutionem, spumam ex ore prorumpentem inducere. S. T. DE MEZA *compend. med. pract. de venen. p. 3.*

7) Id de fungis nonnullis adfirmatur.

rumdam exhalationes ⁸; alia cum foris corpus ingressa, tum ingesta vires suas exferunt, e. g. *Crocus officinalis*. Haec venena, quae pura omni acredine carent, praecipue sensorium commune petunt et adficiunt; adliciunt fluida ad caput, materiam nerueam consopiant, vertiginem, mutos capitis dolores, soporem cet. inducunt, facultates animi, sensus, inprimis visus, et irritabilitatem labefaciunt, vel alio ignoto modo neruorum actionem interdum subito destruunt; et contra haec, inprimis deglutita, naturae vires, quamuis maxime vigentes, nihil valere videntur. Nonnulla autem, aesthetorium conuellendo, sensus externos et internos turbant, sanguinem commouent, motumque muscularem augent ⁹, quod quidem praeter alios effectus, qui stupefacientibus fere tribuuntur, potius ab acri principio, quod vaporosa plurima

8) An florum partes odoriferae maiori copia deglutitae eiusdem efficaciae sint? experimentis decidendum est.

9) Exemplum huius rei opium praebat, quod interne aut externe (in quo posteriori casu saepe celerius et vehementius operatur) adplicatum, cum paralyfin, tum spasmum inducit. Hae conuulsiones, extremitatibus potissimum conspicuae, effecta quidem (vt saepissime his in rebus accidit) secundaria esse possunt, oriundae, dum ablata ab opio. vt variis partibus, ita et cordi irritabilitate, indeque circulo humorum cohibito, primum remotiorum partium vascula minora obstruuntur, sicque pressione neruuli circumiacentes irritantur. Ast in acri principio, quod opio simul inest, cardo maxime hic loci verti videtur — Narcotica paralyfin, acria spasmum producant, alia vtrumque.

plurima sibi adsociatum habent, deriuandum videtur; inde resolutio humorum¹⁰, dolor, inflammatio cum suis sequelis, orgasmus, haemorrhagiae cet. Attamen effectus semper variae proportioni, qua principium principio iunctum est, illorumque plus minusue aliis rebus inuolutorum maiori vel minori puritati respondunt. Sed acria pluraprehenduntur cum nullo principio vaporoso coniuncta, salua diuisione in acria volatilia (non enim omne volatile simul narcoticum est, quod *Rhus Vernix*, *radicans* et *toxicodendron* testantur), vel magis fixa. Etiam id habent venena vegetabilia acria, quod, si languorem, tremorem, paralylin partium inducunt, haec non statim sub initio, vt in vaporosis, eueniant; sed nimiam intensiorem virium motricium, nunc relaxatarum, sequantur; et quod corpus in putridam resolutionem vertant, alia minuto citius, vt Americanorum

A 5

toxica

- 10) Quum sciamus, morbis putridis, et quidem interdum diu ante eruptionem morbi, pusillanimitatem, languorem, tristitiam praecedere, et pharmaca narcotica idem efficere omnesque functiones labefactare atque tunc humorum diathesin putridam inducere: verosimile est, materiam nerueam, rite constitutam, in debita humorum crasi conseruanda multum valere; deprauatam contra dyscrasiae, eiusque putridae genesin adiuuare vel excitare. Adcedit, quod in morbis hisce non modo acida, sed et analeptica, roborantia, alexipharmaca et spirituosas, mensque tranquilla et hilaris putrescentiae humorum obsint. Atqui putredo humorum non caussa morbosae materiei nerueae, sed effectus illius (aut acris veneni, vel vtriusque simul) esse videtur.

toxica sagittaria, alia serius. Quibus magna vis et fluidorum et solidorum cohaesionem dissoluendi est, septica, corrosiva nuncupantur. Venena styptica, in quibus natura sua nihil volatile inest, et constringendo, obturando dolores, inflammationes, spasmos cet. inducunt, ex acrium ordine non quidem remouenda sunt; deprehenduntur tamen validiora et frequentiora in regno minerali, e. g. variae aëris species et vapores acidi, qui sensilissimorum bronchiorum ramis spasnum inferendo, extemplo interdum necant; plumbum cet. Acida concentrata et spiritus rectificatissimus, quos regnum vegetabile largitur, non styptica, sed gelatinam humorum coagulantia sunt.

Sunt etiam alia adhuc venena acria; regni vegetabilis olea puto, atque vnguiua, e. g. oleum oliuarum, amygdalarum, pistaciorum, pinearum aliarumque nucum ac seminum, quae sponte rancida euadunt, siue ignis ope empyreumatica. Vtroque modo fiunt tetra, amara, ardentia, septica. Laedunt ingesta digestionem, incendunt fauces, oesophagum, ventriculum et intestina. Surgunt vehementes vomitus et diarrhoeae; transit pernicioosa acredo in reliquam humorum massam, inquinat istam febresque euoluit.

Cur narcotica non vias vrinarias, nec pulmones cet. sed cerebrum praecipue petant? in quo acre, in quo stypticum consistat? explorare,

rare, nobis datum non est. Differentiam, quae singula intercedit, et magni momenti in methodo medendi est, nos effectus docent.

Vtrum venena chemica magis, an mechanica corpus animale infestent? definiri vix potest. Haec, inprimis interne adsumta, licet in minora vascula non admittantur, sibi quae ipsa viam saepius praeculant, tam intime partibus impacta haerent, vt nullo fere modo detergeri, inertia reddi et exturbari possint, pariter atque lentae mortis causam exhibeant, vel gangraena et conuulsiones miserae vitae finem faciant. Illa minimos quidem canaliculos diuersarum partium: renum, cerebri cet. pro varia ipsorum indole intrant, subtilissima fluida turbant et inquinant intimamque solidorum fabricam dissolunt, et sic quasi radices vitae conuellunt. Verum enim vero gaudemus remediis minimas cavitates permeantibus, quibus persequi illa valeamus. In vniuersum nil certi hic definiri potest.

Porro venena distribuuntur in *manifesta*, quae certis signis cognoscuntur, et *clandestina*, quae nihil suspecti prae se ferant, aut adeo sensibus nostris blandientia, eoque ipso vigiles naturae nostrae vires consopientia in corpus irrepunt illudque opprimunt, eoque iam laeso demum patefiunt. — Alia tandem *acuta* sunt, quae subito conficiunt; alia *chronica*, quae ferius et lente vitam absumunt. Quod quidem
discri-

discrimen tantum non semper a veneni profapia, dosi, constitutione subiecti, cui, et loco, quo applicatur, dependet.

Possunt diuersis viis animale corpus ingredi venena: *primo* deglutitione, *secundo* respiratione per os vel nares ¹¹, *tertio* clysteribus, *quarto* resorptione cutanea, *quinto* vulneribus ¹², *sexto* iniectione in vasa vel cauitates quae scitu omnino necessariae sunt, dum his maior minorue venenorum efficacia ex parte respondeat. Alia enim tum interne, tum externe, alia tantum interne, alia externe tantum applicata vita priuare possunt.

Illud tamen magis singulare est, quod non omne omnibus venenum sit ¹³, cuius phaenomeni

11) Etiam ope neruorum olfactoriorum et gustatoriorum, itemque cutem perreptantium encephalum adfici potest.

12) Quaedam per vulnus applicata non, sed vasis ipsis infusa demum veneno sunt, e. g. decoctum Hellebori albi, spiritus vini simplex l. camphoratus, acida, oleum oliuarum. Verum est, haec necem arcerfere inprimis circuitum humorum impediendo, nimirum vel fluidorum coagulatione, resolutione, expansione, vel parietes vasorum constringendo, aut paralyticos reddendo. At tamen irritatio, quam haec infusa sensibilibus vasorum parietibus imprimunt, ad sensorium commune propagata in phaenomenis explicandis negligenda non videtur.

13) Hoc etiam de brutis valet. Sic venenum est Phellandrium *aquaticum* equo, non oui, non caprae; Cicutavirosa vaccae, non equo; saccharum columbis; Euphorbia homini, nec Sphingi Euphorbiae; Hyoscyamus
et

meni rationes variae esse possunt: 1° aetas, 2° virium digestivum robur varium, 3° liquoris gastrici et enterici conditio (secundum quam e. g. acescentes venenis narcoticis et putridis magis resistunt), 4° primarum viarum mucus copiose congestus, acria, irritantia inuoluens, 5° in genere tunicae intestinorum minus sensibiles, 6° reliqui corporis humores euchymi l. cacochymi, tenaces, lenti, aquosi, acres, putridi, cuidam pharmacorum speciei obuersi, 7° copia fluidorum, 8° dispositio nervorum plus minusue sensibilibus¹⁴⁾, 9° conditio integumentorum, 10° consuetudo.

Venena insinuantur corpori animali ex triplici causa: dolo, errore aut ignorantia. Quum modus huiusmodi facinus perpetrandi infinitus fere pluribusque forte ignotus sit, remedia etiam illius impediendi enumerari nequeunt; multa tamen venenorum cognitio auertere valet mala.

Saepe-

et *Mandragora* homini, nec porcis; his contra baccarum *Piperis nigri* (etiam muscis lethalis) vel minor dosis. Et multa animalia venenatorum vegetabilium cibo utentia homini noxium et exitiale alimentum praebent. Sed de his nunc non sermo est.

- 14) Inprimis aegrotantium systema nervorum sensibilibus, fibraeque musculares irritabiliores sunt; non tamen semper constitutio valetudinaria et morbus nervorum est, si nonnulli, cumprimis feminae, e. g. diuersi generis odores difficile ferunt, et cephalalgiam, vertiginem, lipothymiam et convulsiones inde experiuntur; sed singularis naturae dispositio, quam idiotyncrasiam vocant.

Saepe numero loco esculentorum aut medicamentorum in corpus nostrum deferuntur. Haec forsā optime praecautentur, si ab vrbis vel regionis superioribus cautum et consultum erit, vt cuiuscunque loci incolis plantae noxiae vel infidae ibi crescentes innotescant. Plantae eiusmodi, flore vel fructu praeditae, publicis locis suspendi possunt, maxime conuentibus et magna hominum frequentia. Iis etiam, quorum curae greges pecorum traditi sunt, illas monstrare earumque effectus narrare conuenit. Dantur enim plantae, e. g. *Cicuta virosa* cet. quae frequentius animalia bruta enecant, quam homines. Pastores eiusmodi pascua euitare, aut a plantis hisce, quantum fieri potest, purgare debent, imprimis si ipsorum gregibus noua, nec isti regioni adsueta pecora subinde adcedunt. Imminutio ipsa (non exstirpatio) harum plantarum in regione quadam copiosius crescentium, etiam multa damna arcebit.

Virus autem vegetabile, corpori animaliam illatum, se manifestat — ni subito iugulat, vt varia toxica telis adplicanda — variis (dum locum, cui admotum est; vel alias partes remotas siue per consensum neruorum, siue ipsum in illas transiens; vel totum corpus vario modo adficit) symptomatibus, et nisi per vias excretorias e corpore expellitur, nec a viribus naturae animalis subigi aut adsimilari potest, laesionibus (cadauere dissecto saepe demum per-

perspicuis) inductis, ad machinae animalis plenarium interitum vsque faeuire continuat.

Quod ad remedia adtinet; venena nonnulla, partim ob celeritatem, qua operantur, partim ob indolem suam ignotam, omnia auxilia respuunt. Venenis omnis generis ore assumptis initio, vt et interdum in progressu morbi inde oriundi, educentia opponuntur: emetica vel purgantia cum magna copia fluidi cuiusdam aquosi, oleosi, in genere veneni ingenio, nisi illud medentem fugiat, adcommo-
 ti, pariter ac eiusmodi clysmata.

Humoribus tandem veneno iam inquinatis, diluentia largissima dosi ingurgitanda sunt. Narcoticis et putridis acida vegetabilia et mineralia, serum lactis cet. medentur, opio aliisque vehementioribus stupefactiuis praecipue Ipecacuanha et acidum salis dilutum fortiter resistit, quibuscum analeptica, roborantia, vesicatoria, excitantia coniunguntur. Etiam Cucurbita *Citrullus* Opio opponitur; acribus et stypticis involuentia, omnis generis mucagines, lac vegetabile et animale, eademque olea non rancida, pinguedines, axungiae cet. Quorum autem acrimonia acidae indolis est, alcalinis refrenantur, e. g. *Scilla maritima*, *Iatropha Manihot* cet. cuius, vt et aliorum venenorum, antidotum Indi quidem Orleanam interne datam; alii piper crudum cum lactis cremore immediate ingestum laudant. *Ari* acredinem vinum et acetum

acetum temperat. *Ligni colubri*ni effectus antispasmodica tollunt¹⁵. Oleorum rancidorum et adustorum vis optime mucilagimbus, nec non aquae, in qua sal quoddam alcalinum vel ipse sapo recens soluitur, larga quantitate, quibus stimulus, emesis, vel catharsis mouendi addi potest, infringitur. Non omnia acria *emetica* aut *purgans* irritans, stimulan, sed solam aquam tepidam aut oleosa ferunt, copia largiori haurienda. Vaporoso - acria, magis inuoluentia nec acida requirunt, e. g. *Ranunculi*, *Aconitum Napellus*¹⁶ cet. Remedia ad Raphaniam optima habentur: radix Valerianae *sylvestris* et Angelicae *sylvestris* cum nitro, castoreo et camphora. Rustici sinolandici in Suecia tinctura Alchemillae *vulgaris* felici cum successu vsi sunt. Nec balnea tepida vlli remedio hic postponenda sunt. — Aliqua, inprimis quae externe solum corpus adficiunt, methodo antiphlogistica domantur, e. g. *Rhois* quaedam species; Americanorum toxicum sagittarium, nisi vasa sanguifera, sed lymphatica tantum

15) Maiorem dosin *Ligni colubri*ni puluerisati a quodam deglutitam sequebantur tremor et imbecillitas artuum, atque in alio praeter tremorem etiam sopor et desipientia; vterque aegrotus opiatibus breui restituebatur.

16) *Napelli* et vinum antitoxicum habetur; *Aconiti* effectus tolluntur vesicatoriis, diaphoreticis, balneis. *Ranunculis* alii quidem Runicem *scutatum*. *Acetosam*, *Acetosellam* cet. opponunt; id quod alii reprehendunt, aquam frigidam et tepidam copiose haustam atque balsamum pernuianum praeferentes.

tantum laesa sunt; cet. Ad venena, quae telis aliisque instrumentis adplicantur, imprimis cito necantia, nullo certo adhuc remedio gaudemus. Feri tamen Americani, *Hernandiae sonora* radículas et *Thaliae geniculatae* radicem (quam in *Mancinellae* veneno expellendo atque gangraena vesparumque cet. ictu extollunt) ad vulnera telis venenatis inflicta variaque alia venena, vtrasque et contusas parti laese impositas et interne sumtas vt praesentanea antidota adhibent. Quum tamen in prodendis effectibus cum anguium morfu tam prope conueniant; iisdem forte antidotis vti possemus: nimirum ligatione partis adfectae, scarificatione, vstione, puluere pyrio vulnere insperfo et accenso, insperfone pulueris cantharidum, excisione vulneris, cucurbitulis coecis, succtu (Marforum et Pfsyllorum more, nam et haec deglutita non nocent), inunctione oleorum blandorum, venae sectione ad animi deliquium vsque, internis medicamentis ¹⁷. Fusior explicatio methodi, effectus venenorum, tam statim subsequens, quam post aliquod demum tempus contingens, tollendi, *Therapiae speciali* relinquenda est.

In

- 17) A saccharo, acidis, alcalinis exiguis fructus expectandus est vel nullus; quamuis in viperæ morfu spiritus salis ammoniaci, secundum recentiorum experimenta, praesentissimum fere remedium existat. — Vbi conuulsiones aegrotum exercent, antispasmodica multum efficiunt.

B

In ipsis autem plantis proponendis sequenti modo processi:

Praetermissis plantarum characteribus synonymisque, utpote in LINNEI *Speciebus Plantarum* et *Systemate Vegetabilium* (vtror utroque libro a. b. d. D. I. I. REICHARDO coniunctim edito) fusius expositis, solummodo nomen Linneanum triuiale indicaui. Vbi vero e *Supplemento Plantarum*, quod C. A LINNE filius, nunc b. d. 1781. edidit; vel alio Auctore plantas, a LINNEO patre nondum adlegatas, adduli, semper fontem simul, ex quo hauriebam, indicaui.

Praecipuas quoque plantarum icones adlegauit.

Secundum LINNEI mentem (vid. eius *MATERIAM MEDICAM*, cuius supra iam mentio facta est) plantae *vulgares* dicuntur, quae sponte apud nos crescunt; *cicures* vero Exoticae, quae semel in hortos nostros introductae, facile per se subsistunt ex Annuo semine vel Perenni radice; *mansuetae*, quae more animalium mansuetorum apud nos pulchre degunt, modo per hyemem tecta subeant vel parum a gelu defendantur; *ferae*, quae ferarum instar toto anno intra claustra Caldarii coercendae et custodiendae sunt, ne aufugiant pereantque, quales vix fructum nostro sub climate ferunt; et *peregrinae*, quae Europaeis hortis vix vnquam innotuere, adeoque e peregrinis terris arcessendae.

Vege-

Vegetabilium, vt venena considerans, virtutes medicas et oeconomicas vel silentio praeterii, vel tunc demum subiunxi, si ad indolem veneni curatius intelligendam facturas existima-
bam (sic enim vis serpentum morsus sanandi, et antiphthiriaca fere pharmacon heroicum in-
nuit); plantaque ni tota venenata est, partes eius modo vna cum viribus suis enumeraui.

In effectibus venenorum enarrandis, quum nimis longum, immo superfluum foret, illos, qui a plantarum vel subiecti, eos experientis, qualitate indiuiduali dependent, non semper indicaui. Exemplo sit venenum conuulsium; hoc in diuersis hominibus diuersae etiam speciei conuulsiones exferet: in alio opisthotonum, in alio spasimum cynicum cet. Hic in genere conuulsiones vel illarum magis consuetas referre satagit.

Effectus de brutis obseruatos tunc demum recensui, vbi de hominibus nulli constabant.

Plantis, quarum venenata vis dubia adhuc dum est, inter vere venenatas seriem suam systematicam quidem reliqui, demto tamen numero, huiusque loco duobus asteriscis antepo-
sitis notatas.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

GRATIOLE.

1. *G. officinalis*. *Fl. dan.* t. 363. *Blackw.* t. 411. *Ludw.* *ect.* t. 61. *Sabb. hort. rom.* 2. t. 87. *Zannich. venet.* t. 295. *Bulliard herb. de France* t. 130.

Locus: Europae australioris, vt et Heluetiae, Palatinatus, Austriae, Germaniae et Brabantiae prata humida et sicca.

Perennis, cicur.

Qualitas: herb. inprimis virentis amara, nau-seosa, inhaerens inodora.

Vis: vomitoria, purgans, pellens.

Effectus: Emesis, Hypercatharsis, (a dosi iusto maiori) lethalis.

SALVIA.

- ** *S. Hormini* odor fortis, sed gratus, stupefaciens cephalalgiam excitat.

** *pra-*

1. Quaecunque purgantia drastica venenis adconscribi merentur. Incongrue sumta necant vel subito, vel tanto impetu vitae robur concutiant, vt sanitas, et cum ea longaeuitas detrimentum non possit non capere longe maximum. Vires digestrices et neruorum systema ita labefactantur, vt debita nutritione turbata innumerisque vitiis contractis corpus, lento tanquam miasmate infectum, subinde contabescat, morsque praematura tragoediae finem faciat. — Equi a *Gratiolae* foeno immista marcescere feruntur.

** S. pratenfis internus vſus hypnoticus eſt.

** S. glutinoſa ſubnarcotica eſt.

** S. Sclarea S. *Horminum* ſuperat.

TRIGYNIA.

PIPER.

2. P. latifolium. *Suppl. p. 91.*

Locus: Taheiti. *Infrequens.*

Colitur in Infulis Pacificis aliisque locis.

Qualitas: radic. — —

Vis: narcotica.

Effectus: (potus inde parati largiusque hauſti) Sopor, Stupor, Ebrietas. Temporis lapſu peculiare exanthema potus abuſu prouenit: Cutis quaſi calore et aëre torrefacta corrugatur, nigreſcit, interdum paruis lamellis deſquamatur; ſimul ophthalmia inflammatoria, lippitudo, contabeſcentia corporis adcedunt animaeque facultates debilitantur; ſquamas, tumor ſubſtratus, et creſcente morbo, maculas albas vlcera excipiunt ſub cute ſerpentia atque ex fungoſo foramine ichorem fundentia; albae maculae interdum cum rubeſcentibus et viridi-flauelcentibus alternant.

** P. geniculatum (*Naturf. 19. 150.*) ingrate aromaticum. An toxicum?

CLASSIS III.
TRIANDRIA.
 MONOGYNIA.

R V M P H I A.

** *R. amboinensis* fructus purgant.

C N E O R V M.

3. *C. tricocon.*

Locus: Hispaniae, Italiae, Narbonae colles
 glareosi. *Frutex, cicur.*

Qualitas: baccarum amara, acris, *Daphnes* vel
Euphorbiae.

Vis: irritans, hydragoga.

Effectus: Hypercatharsis, Intestinorum In-
 flammatio,

COMOCLADIA.

** *C. dentatae* (*Iacq. amer. 13. t. 173. f. 4.* — An
C. integrifoliae varietas?) arboris in Ameri-
 cae septentrionalis sylvis passim habitantis,
 ceterum vix odorem spargentis, fauciatae ve-
 ro succum album, viscidum, aëre nigrescen-
 tem, e linteis commaculatis vix vnquam et
 cute, epidermide desquamata demum ab-
 luendum, stercoris aut sulphuris hepatis in-
 star foetentem deplorantis exhalationes sub
 ipsius umbra dormientibus, potissimum ple-
 thorics

thoricis et obesis saepissime lethales fuisse, Cubae incolae adfirmant; licet CL. IACQVIN per aliquot tempus sub arbore commoratus nil mali inde perceperit.

MELOTHRIA.

*M. pendulae baccas Nigritae in America venenatas credunt.

CROCVS.

4. C. sativus officinalis. *Morif. hist.* 2. 335. f. 4. t. 2. f. 1. *Blackw. t.* 144. f. 1.

Locus: Helvetiae, Lusitaniae, Thraciae et Pyreneorum alpes. *Biennis, cicur.*

Qualitas: stigmatum fragrans, subaromatica, luteo - tinctoria.

Vis: narcotica, hypnotica, exhilarans, resolvens, pellens; tum externe evaporatione, tum interne.

B 4.

Effect.

4. Fragrantem evaporationem florum diuersorum e.g. Croci sativi officin. (specie a C. verno innocuo differentis), *Lonicerae* variarum, *Nerei Oleandri*, *Lilii candidi*, *Polianthis tuberosae*, *Adenantherae paonicae* (cuius exhalationes suauissimae animi deliquia et angustias, fortassis et mortem inducunt), *Rosae centifoliae*, *Violae odoratae* ect. lethalem apoplexiam intulisse, satis constat. Et quum hic effectus plantis validi odoris fere omnibus tribuendus videatur; plantarum harumce, utpote sat numerosarum fusorem expositionem, ni ceterum malignae sint, mittendam esse existimaui, ne praeter necessitatem paginarum volumen nimis intumesceret, veritus.

Effectus: sensuum Vigor, Risus profusus et immoderatus, Vigiliae; tunc Vertigo, Cephalalgia, Temulentia, Somnolentia, Delirium; Spasmus risum sardonium aemulans, Haemorrhagia, Apoplexia lethalis.

GLADIOLVS.

** G. communis ob acredinem suam suspectus est.

IRIS.

5. i. germanica. *Blackw. t. 69. Ludw. ed. t. 112. Bulliard herb. de France t. 141.*

Locus: Germaniae, Languedociae, Galloprovinciae, Heluetae edita. *Perennis, cicur.*

Qualitas: radicis recentis acris, substyptica, amariuscula; odore subnauseosa. *Fecula iners.*

Vis: diuretica, purgans, hydragoga, subnarcotica, subemetica, errhina.

Effectus: Faucium Exustio, Profluuium Alui.

6. I. Pseud' Acorus. *Fl. dan. t. 494. Knorr. del. hort. 1. t. L. 8. Ludw. ed. t. 101. Blackw. t. 261. Bulliard herb. de France t. 137.*

Locus: Europae paludes. *Perennis, vulgarissima.*

Qualitas: radicis insipida, substyptica; florum quoque acris.

Vis: adstringens, calefaciens, hydragoga.

Effectus:

7. I. foetidissima. *Blackw. t. 158.**Locus* : Gallia, Anglia, Italia, Hetruria.*Perennis.**Qualitas* : radicum et florum tetra, foetida (*Cotulam* et cimices olens), acris; femina feruida: color florum caerulefcente-triflis, ingratus.*Vis* : narcotica, diuretica, purgans, pellens.*Effectus* :

8. I. virginica.

Locus : Virginiae humida, aquofa. *Perennis.**Qualitas* : praecedentium.*Vis* : draftica cet.*Effectus* :

8. Huc forte et aliae *Irides* referendae, quae odore, vel radice, praecipue recenti, veneno effe poffunt. — Hanc adnotationem lector beneuolus in vltiori harumce plantarum enumeratione faepius animaduertifurus intelliget, multas plantas, et iure quidem virulentiae fufpicionem inire, quas quempiam vsquam necaffe, experientia nondum confirmat; quia nimirum, (nam faepe aliis non minus frequentes crefcunt) perfidiae notis, quibus natura illas diftinxit, quasue cum aliis toxicis, iam cognitis, communes habent, homines aliaque animalia ab ipfarum vfu auocant.

DIGYNIA.
PHALARIS.

9. *Ph. arundinacea*. *Fl. dan. t. 259. Leers herb. n. 49. t. 7. f. 3. Scheuchz. gram. 1. 6. t. 3. f. 4. A. B. C. Moris. hist. 3. 203. f. 8. t. 6. f. 41.*

β. *Ph. picta*.

Locus: Europae subhumida ad ripas lacuum.

Qualitas: mechanica.

Vis: vulnerans, inflammans.

Effectus: Pabulo haud cedit, nisi multum esuriant et penuria melioris admodum laborent veterina, nec eo greges vescuntur, quippe quibus non modo ingratiſſimum, verum etiam maciem, sitim, tabem conciliare creditur, linguam et oesophagum vulnerare et arctare, sanguinem in ventriculum elicere, unde tumefactio et inflammatio et mors plerumque subsequitur.

CYNOSVRVS.

** *C. cristati* semina contusa anati et gallo non placent.

** *C. echinatus*. Crescit in Europae australioris e. g. Meylandiae cet. agris praecipue humidis inter *Secale*; inde frumento immixtus cum eo in panes tetri saporis coquitur, quibus frequenter vespcentes in morbos incidunt. *Cynofuri* semina subtilia cum paleis suis molita et cocta panem exhibent humidum, ponderosum, glutinosum, qui non facile siccescit, sed

sed potius in corruptionem abit. Panis adhuc calidus, cuius mixtionem seminum furfures, quibus ingratus et amarus sapor debetur, intrant, diarrhoeam, vt et cephalalgiam et vertiginem excitauit; repetita vero illius coctione pars maxima narcoticae vis (cum ea *Lolii temulenti* fere congruentis), quae gramini praecipue mense Iulio et Augusto inest, perditur. Quamuis farina, quae flauescens et omnis fastidiosi odoris saporisque expers est et subacta in massam (quae caseos olet, sed in panem cocta nullius saporis foedi et esculenta est) innocua dicatur; principium nocuum tamen illi inhaerere videtur, quia illud nimirum fermentatione demum euoluitur, et farina cruda sues consopit. Acuitur, quod farina continet, virus furfure admisto. Etiam eo, quod panis multam absorbeat aquam eamque sibi adsociatam retineat, indoles eius praua augetur. Seminum lac ingratum incendit oesophagum. — Ceterum farina paruum amyli copiam continet, illa tritici parum ponderosior, fermentatu faciliior atque ad putredinem pronior est, aliisque farinae speciebus maiorem aquae copiam absorbet.

ARVND.

** *A. Bambos.* In aquas, in quas *Arundinis* huius flores decidere, balneatum descendentes, febre adfici, Cinghalenses perhibent.

LO.

LOLIVM.

10. *L. temulentum*. *Fl. dan.* 160. *Monti* 39. t. 18.
Bulliard. herb. de France t. 107.

Locus: Europae agri inter hordeum, linum
 cet. Suecia, Russia, Hispania, Gallia, Ita-
 lia, Asia minor? *Annua, vulgaris.*

Qualitas: totius plantae inodora, subresinosa,
 acris; calefactae, tostae vel fermentantis
 nauseosa, vaporosa; seminum subdulcis,
 haud ingrata; farinae caerulefcens, diffi-
 cilius fermentans; pultis inde paratae et
 panis, cumprimis calidi, nigra, amara.
Cereuisia, spiritus adustus cet.

Vis: maxime *feminis*, humores expandens,
 obtupefaciens, nervis infesta.

Effectus: Dinus, Temulentia, Scotódinus,
 Sensuum perturbatio, Sopor, Phantasmata,
 Cephalalgia, Occoecatio, Amaurosis tran-
 siens, bulbor. ocul. Rigiditas, Marmarygae,
 Aurium Tinitus, Susurrus; Baryikia, Spa-
 smi, Languor vniuersalis, Tumor, Impo-
 tentia; Calor intensus, Palpitatio Cordis,
 Anxietas Praecordiorum, Deglutiendi et
 Loquendi Difficultas, Cardialgia, Cardiae
 constrictio spastica atque Pylori cum sub-
 sequente Conatu Vomendi; Sudor frigi-
 dus,

10 *Lolium temulentum* variat spicis muticis. — Infan-
 tibus et iuuenibus magis, quam adultis et senibus infestum
 est. — An *Bromus secalinus* vertiginem excitet? Ne
 hic cum *Lolio* confundatur.

duſ, ſpiſſus, Paralyſis, rarius Haemorrhagiae, Inſipientia, Apoplexia, Mors, rariffime ſubita. Saepe criticus vel Somnus, vel Sudor, vel Diureſis.

SECALE.

II. *S. cereale* (hybernum). *Blackw. t. 224.*

Locus: Creta.

Annua, (biennis), frequentiffima.

Qualitas: *Secalis cornuti* (*Bulliard herb. de France t. iii.*) et farinae recentis inde paratae caeruleſcens, naſeoſo odore et ſapore, fermentatu non facilis, acris.

Vis: irritans, ſpasmodyca, narcotica, ſenſus obtundens.

Effectus: Raphania.

II. *Secale cornutum* ſunt grana, quae humida terra et tempeſtate monſtroſe excreuerunt indeque prauam induerunt indolem quamdam. — Non nullis quoque auibus et inſectis deleterium eſt. Gallinae, vel ſues, anates, anſeres et muſcae aqua, qua lauatum eſt *S. cornutum*, epota perierunt. — Vel panem e vilibus et corruptis granis ſecalinis, licet non monſtroſis, et farina huiusmodi coctum, idem malum produxiſſe, obſeruatum eſt. Sine dubio virus etiam in granis, adparenter ſanis latere poteſt. — Nec tamen omnibus *S. cornutum* veneno eſſe videtur. — Viſtilago Tritici, Hordei, Auenae cet. innocua eſt.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

12. *G. Alypum*. *Niss. act.* 1712. 336. t. 18. *Clus. hips.* 179. ic. 180.

Locus: Monspelii, Regni Valentini et Italiae
sylvae ad rupes et saxosa. *Fruticans.*

Qualitas: herbae adstringens.

Vis: purgans, drastica.

Effectus: Hypercatharsis cet.

PLANTAGO.

- ** *P. Cynops*, cuius semen purgans est, virulentiae
suspicionem incurrit; nimius enim istius
usus ventriculum offendit et animi deliquium
cum mortis periculo infert.

TOXICARIA.

13. *T. americana*. *Schreber. Naturf.* 19. 146.

Locus: America australis. *Arbor.*

Qualitas: acerrima.

Vis: calida, resoluens.

Effectus: Toxicum sagittarum.

SANTALVM.

14. *S. album. Rumph. amb. 2. 42. t. II. Breyn. ic. 94. t. 5. f. 1.*

Locus: India, Siam, Timor, Solor. *Arbor, peregrina.*

Qualitas: ligni flauī fragrans amaricans.

Vis: sudorifera, (l. recent.) subuenenata.

Effectus: Ventus ab arbore flans febrim synochae similem obuio inducit.

DIGYNIA.

HYPECOVM.

15. *H. procumbens. Mill. dict. n. 1. ic. t. 150. f. 1. Lob. ic. 744.*

Locus: inter Archipelagi, Narbonae et Salmaticenses segetes. Circa Astrachan.

Annua.

Qualitas: succi flauescētis, quae opii.

Vis: somnifera.

Effectus:

16. *H. pendulum. Mill. dict. 2. ic. t. 150. f. 2. Lob. ic. 743.*

Loc.

14 Vna eademque species *lignum Santali album* et *citrinum* largitur; iuniorum arborum nucleus solus flauus, cetera pars vero aetate demum flauescere dicitur. Sunt tamen arbores, quae semper integrae albae deprehenduntur; et in aliis regionibus arbores omnes citrinae, in aliis omnes albae sunt, quae differentia tamen facie externa cognosci non potest. *Album odorum* non est.

16. Huc et *H. erectum* non nulli referunt.

Locus: Galloprouincia, Hispania, Sibiria.

Annua.

Qualitas: herbae praecedentis.

Vis:

Effectus:

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

HELIOTROPIVM.

** *H. europeum* et *supinum*, quorum herbae vis est laxans, seminum septica, emmenagoga et abortiua, suspectum est.

CYNOGLOSSVM.

** *C. officinalis* herbam quosdam loco alius oleris edisse et inde in somnum profundum XL horas protractum incidisse, vnumque illorum mortuum esse, MORISON narrat. Tantaе hanc herbam efficaciae esse, vix crediderim!

CYCLAMEN.

17. *C. europaeum* *Iacq. austr. t. 401. Knorr. del. vol. 1. t. S. 16. Zorn. ic. cent. 1. t. 72. Sabb. hort. 2. t. 68. Blackw. t. 147. Mill. dict. ic. t. 115. Bulliard. herb. de France t. 5.*

Locus: Asiae, Europae australis, Pannoniae, Hungariae, Austriae, Tartariae sicca, umbrosa, nemorosa, Heluetiae et Germaniae alpes. *Perennis, cicur.*

Qualitas: rad. carnosae, praecipue recent. et auctumno effossae mucilaginoso - acris, vrens,

17. Cum hoc *Cyclamen indicum* conuenire videtur.

vrens, amaricans. Radix vsta et fecula eluta innocuae sunt.

Vis: purgans, draſtica.

Effectus: Tormina, Hypercatharſis. Radicis ſuccus ſtrangulationem et quaſi ſuffocationem infert.

SPIGELIA.

18. Sp. Anthelmia. *Amoen. acad.* 5. 133. t. 2. *Brown. iam.* 156. t. 37. f. 3. *Pet. gaz.* t. 59. f. 10.

Locus: Braſilia; ſeritur in Iamaica, Caienna, Domingo, Martiniqua cet. *Annua, fera.*

Qualitas: herb. tetra, foetida, acris.

Vis: narcotica, hypnotica, draſtica, pellens.

Effectus: Sopor, Rigiditas Oculorum, Scintillae, Dilatatio Pupillae, Hyperemefis, Hypercatharſis.

19. Sp. marilandica. *Hope act. edinb.* 3. ann. 1771. 151. t. 1. *Catesb. carol.* 2. t. 78.

Locus: Virginia, Marilandia, Carolina et alia Americae ſeptentrionalis loca.

Rad. perennis, caul. annuus.

Qualitas: herb. viſcida, naufeofa. Praecedente fortior.

Vis: praecedentis, ſpaſmodica, paralytica.

Effectus: Vertigo, Scotomia, Oculorum Convulſiones, Ptoſis, Amauroſis.

LISIANTHVS.

20. L. Chelonoides. *Suppl. pl.* 134. *Aubl. guian.* 204. t. 80.

Locus:

Locus: Surinamum, Caienna in altis arenosis.

Frutex.

Qualitas: herb. valde amara.

Vis: draſtica.

Effectus:

'AZALEA.

21. *A. pontica.* *Tourn. Act. Paris. Buxb. cent.*
5. 36. t. 69.

Locus: Heracleae de Ponto, Trapezuntis, Armeniae (ſyluoſa), Asiae mediae? humida, Caucaſi alpes ad mare nigrum vsque.

Frutex.

Qualitas: flor. ſuauecolens.

Vis: narcotica, obſtupefaciens.

Effectus: Nauſea, Vertigo, Cephalalgia, Stupor.

PLVMBAGO.

22. *P. europaea.* *Sabb. hort. 2. t. 39. 40. Col.*
ecphr. 1. 161. t. 161.

Locus: Europa australis: Hispania, Italia, Neapolis, Syracuſa, Gallia australis.

Perennis, manſueta.

C 2

Qual.

21. An ex hac planta mel, vi nauſeam et ſtupiditatem produ-
cendi infectum; edueatur? Nonne itaque ea ipſa eſt illud
Aegolethon PLINII, et *Oleandro giallo* LAMBERTI?
Nectar in *Ericae*, utpote generis alias innocentis, floribus
contentum huiusmodi mel, non nullis exiſtimantibus, ex-
hibere mihi non videtur, licet *Salsola* quaedam ſeminibus
ſolum oleum aethereum forte largientibus polleat.

Qualitas: rad. herb. acris.

Vis: caustica.

Effectus:

23. *P. zeylanica*. *Comm. hort.* 2. 169. t. 85. *Rheed. mal.* 10. 15. t. 8.

Locus: India orientalis. *Perennis, mansueta.*

Qualitas: tot. plant. inprimis recentis, quae est praecedentis.

Vis: vesicans, emetica, diuretica.

Effectus:

24. *P. rosea*. *Rheed. mal.* 10. 17. t. 9. *Rumph. amb.* 5. 453. t. 168.

Locus: antecedentis.

Perennis.

Qualitas: — —

Vis: — —

Effectus: — —

CONVOLVULVS.

25. *C. scammonia* *Morif. hist.* 2. f. 1. t. 3. f. 5.

Mill. dict. t. 102. *Russel.* 13. t. 1. f. A — F.

Locus: Syria, Mysia, Cappadocia per Smyrnam. *Perennis, peregrina.*

Qualitas: rad. foetidiuscula, acri-amaricans, nauseosa, lactescens, gummoso-resinosa.

Vis: purgans, (cruda radice resina debilior).

Effectus: Fastidium, Colica vehementissima, Diarrhoea, Resolutio Humororum, Mors.

26. *C. Turpethum*. *Herm. Lugdb.* 177. t. 178. 179. *Blackw.* t. 397.

Locus: Zeylonae, Malabariae umbrosa, humida. *Perennis, peregrina, fera.*

Quali-

Qualitas: recent. dulciaria, tunc pungens, nauseosa; ficcatae vix sapida, tamen nauseosa. — Planta vulnerata copiosum lac fundit ex templo in gummi subrefinosum, flauescens coagulans, cuius sapor, vt radicis est.

Vis: fere *Scammoniae*, irritans, resoluens, purgans.

Effectus:

27. *C. Ialapa*.

Locus: America, Mexico, Vera Crux. *Perennis, peregrina*.

Qualitas: praecedentis. Ad flammam fumum spirat graueolentem.

Vis:

Effectus:

28. *C. Soldanella*. *Zannich. venet. t. 6*.

Locus: Angliae, Italiae, Austriae, Galliae, Friae littora maris; Carniolia. *Perennis, mansueta*.

Qualitas: herb. nauseosa, acris, amaricans, lactescens.

Vis: draastica, hydragoga.

Effectus: hypercatharsis.

29. *C. Pes Caprae*. *Rumph. amb. 5. 433. t. 159. f. 1. Rheed. mal. II. 117. t. 57. Herm. lugdb. 174. t. 175.*

C 3

Locus:

27. *Ialapae radix* recens solo odore, vt et contundendo vomitum et diarrhoeam saepius excitat.

29. Folia cedunt in pabulum cuniculis, ceruis, damis, capris domesticis et sylvestribus. — Huc sine dubio alii adhuc *Conuoluli* acres, nondum disquisiti, referendi sunt:
C. se-

Locus: India orientalis: Zeylona, Malabaria.

Perennis.

Qualitas: rad. lactescens, resinosa, acris, pungens.

Vis: draastica.

Effectus:

PSYCHOTRIA.

** *P. emetica* in regni Mexicani prouincia Gironensi frequens (*Suppl. pl. 144.*), an toxica? Non nisi certo quodam respectu, si testimonium empyrici cuiusdam autoptae Cl. MVRIS dato, haec vera stirps radicis Ipecacuanhae venalis est. Vid. Linn. S. N. Ed. XIV. p. 214.

LONICERA.

** *L. Xylostei* baccae draasticae sunt, in maiori dosi quoque emeticae.

DATVRA.

30. *D. ferox*. *Morif. hist. 3. f. 15. t. 2. f. 4. Barr. var. 109. t. 1112.*

Locus: India orientalis, China cet. *Annua*.

Qualitas: sequentis.

Vis: — —

Effectus:

C. sepium, cuius succi lactei, vulnerato caule defluentis et inspissati Scrupulus vnus vel Drachma dimidia *Scammoniae* instar purgare dicitur. Etiam *C. repentis* succus lacteus purgat, vt et *C. brasiliensis*.

Effectus: *femin.* Turbatio et Alienatio Mentis, Ritus, Eiulatus, Sopor, Stupiditas, Obliuio.

31. D. Stramonium. *Blackw. t. 313. Stoerk. lib. d. Stram. cet. p. 1. t. 1. Knorr. del. 1. t. S. 13. Sabb. hort. 1. t. 92. Fl. dan. t. 436. Garid. aix. t. 94. Zannich. venet. t. 84. Buliard herb. de France t. 13.*

Locus: America, Europae ruderata calidiora.

Annua, cicur.

Qualitas: totius plant. amara, virofa, halituo-fa; rad. calida; flor. suavis, tunc grauis; fem. insipida, inodora.

Vis: narcotica, exhilarans, amnestica, phantastica, dementans, hypnotica; etiam fructus.

Effectus: Debilitas, Narcosis, Amnesis, Deficientia, Anaesthesia, Delirium, Sudor frigidus, Stupor, Furor, Morositas, Mania, Convulsio, Rigor, Agrypnia; Irritabilitas prostrata, Paralysis Linguae, Siccitas Oris, Vertigo, Amaurosis, Somnus profundus variis insomniis et miris rerum faciebus stipatus, modo Calor totius corporis, modo Artuum Frigus, Tumor Abdominis, potissimum in infantibus; Cephalalgia, Salacitas, Dentium Fremor, Respiratio laesa, Apnoea, Impotentia, Apoplexia,

C 4

Mors,

31. In ventriculo infantis, femine huius plantae deglutito demortui, semina indigesta plane reperiebantur. — Semin. Drachma dimidia adultos inebriat, Drachmae duae necant.

Mors, subita, lenta. — Diffectum cadaver cerebrum sanguine turgidum demonstrat. *Externe folia adplicata Pupillae Relaxationem, saepe insanabilem, inducunt.*

32. *D. Metel.* *Ludw. edf. t. 158. Kniph. cent. 1. t. 24. Rumph. amb. 5. 242. t. 87. Rheed. mal. 2. 47. t. 28. Olear. mus. 27. t. 18. f. 1. 3. 6. 7.*
Locus: Asia, Africa, Aegyptus, Palaestina.

Annua, mansueta.

Qualitas: praecedente virulentior.

Vis:

Effectus:

HYOSCYAMVS.

- ** *H. aureus* tremorem et debilitatem induxit; floris qualitas inodora, sed falsa et amara est.

33. *H.*

32. Saltim in naturali solo *D. Metel* maioris efficaciae est, quod et forte *D. Stramonium* respicit. *D. Tatula*, quae etiam odoris grauis est, cuiusue flores et semina mentis agitationem iniecere, debiliior est, quam *Metel*; idem de *D. inermi* valere videtur. Huc et alias *Duturae* species referas. Attamen *D. arborea* (*Fewil. peruv. p. 761. t. 46.*), cuius locus natalis est Peru, Chili, Vera Crux, et quae pulchretudine et florum odore amoenissimo adeoque forti, ut unica arbor totum fragrantiae suae vi hortum replere valeat, Europaeas stirpes, FEWILLIE teste, superat omnes, mitissima videtur. Eius folia emollientia et anodina dicuntur; ab incolis adhibentur ad ulcerum suppurationem adiuuandam, atque in omni fere tumorum genere extrinsecus adplicata proficua esse laudantur.

33. *H. niger*. Zannich. *venet.* t. 225. Blackw. t. 550. Ludw. *ect.* t. 85. Knorr. *del.* 1: t. P. 3. Riu. *irreg.* t. 102. Zorn. *ic. pl. med. cent.* 1. t. 84. Stoerk. *lib. de Stram. cet.* t. 2. Bulliard *herb. de France* t. 93.

Locus: Europae ruderata pinguis, viae. *Annua*, rad. *biennis*, *vulgatissima*.

Qualitas: totius pl. foetida, toxica, subinsipida, acris, graueolens, exhalans; rad. et sem. mucilaginoso-dulciaria.

Vis: narcotica, phantastica, dementans, hypnotica, resoluens.

Effectus: Desipientia, periodica vel non, iocosa, morosa; Delirium rixosum, furiosum, Anaesthesia, Capitis Grauitas, Vertigo, Amnesia, Ophthalmia, Caligo, linguae Titubantia, Alalia, Spasmus, Epilepsia, dolens dotius corporis Languor, omnium partium Immobilitas, Hydrophobia, Vomitus, Ructus, Flatus, Gastritis, Gangraena;

C 5

graena;

33. Studiosus quidam Lugduni Batauorum rebus medicis operam dans varias venenatas plantas e. g. *Belladonnam*, *Napellum*, *Mercurialem perennem* cet. impune ingerere poterat; animi leuitate quadam ductus etiam cum *Hyoscyami* seminibus periculum facere animo concepit, quo facto in dementiam et hemiplegiam incidens grauiter audaciae poenas dabat. Attamen a magno BOERHAAVE feliciter morbo restitutus est. HALLER. — Est quidem et equis, vaccis, ouibus, suibus, canibus, auibus, piscibus et insectis veneno; tamen multa mammalia, inprimis caprae, dosin sat magnam, ferre possunt. — Fugiunt mures odorem. — Frigore virus infringitur.

graena; Paralyfis, Sopor infomniis terribilibus ftipatus, non nunquam in Apoplexiam abiens; interdum Nausea, Tormina, Diarrhoea, Tumores, Sitis in explebilis, sudor frigidus, Hydrops, Pruritus cutis, Ischuria, Febris, Palpitatio Cordis, Lipothymiae, subitus Pallor, Livor totius corporis, Arythmia, Dyspnoea, Anxietas, Sterilitas, Mors.

34. *H. albus.* *Blackw. t. III. Sabb. hort. I. t. 91.*
Mill. dict. t. 149. Bulliard herb. de France t. 99.

Locus: Europa australis, Africa, India orientalis.

Annua, cicur.

Qualitas: praecedente minus toxica.

Vis:

Effectus:

35. *H. muticus.* *Alp. exot. 193. t. 192?*

Locus: Aegyptus, Arabia.

Biennis.

Qualitas:

Vis:

Effectus: — — Aliquot dierum Mania, Delirium cet.

36. *H. physaloides.* *Amoen. ac. v. 7. t. 6. f. 1.*

Locus: Sibiriae subhumida, opaca; ad Angarae cataractas.

Perennis.

Qualitas: — — Microscopium vegetabile; idemque in iusculis, cereuisia et aliis praeparatis.

Vis: inebrians.

Effectus:

Effectus: Peculiaris plane Desipientiae species, microscopii instar minima oculis vt immense magna repraesentans, horrendisque mortis imaginibus animam torquens. Etiam decocto plantae hausto omnia temere effutiunt miseri, quaecunque quiuis eos interrogauerit.

37. *H. Scopolia*. *Iacq. obs. bot. 1. 32. t. 20.*

Locus: Germania, circa Idriam in syluis. *Pennis, cicur.*

Qualitas: rad. fatua; folior. herbacea.— Habitu iam suspecta.

Vis: resolueus, hypnotica.

Effectus: Sopor.

NICOTIANA.

38. *N. Tabacum*. *Blackw. t. 146. Kniph. cent. 4. t. 55. Ludw. ed. t. 167. Knorr. del. 1. t. T. 2. Sabb. hort. 1. t. 89. Renealm. spec. 37. t. 38.*

Locus: America: Peru, Brasilia, Terra firma. *Annua, cicur.*

Quali-

37. Hic atque *H. physaloides* propriam subdiuisionem constituere videntur ob capsulam nunquam dehiscentem. — Et *H. pusillus* venenatis adnumerandus erit.

38. Vel fumi suctum sequuntur: tabes, apoplexia, epilepsia, pectoris, hepatis, ventriculi laesiones. Masticatione inadsueta capitis obnubilationem experiunt. Decoctum foliorum scabiosis partibus adplicatum vomitum cruentum et conuulsiones creauit; atque femina hysterica a clymate foliorum morte abrepta est. Puluis huius stirpis ptarmicus haemorrhagias lethificas, apoplexiam, odoratus abolitionem, auditus laesionem cet. intulit. — Oues plantam innocue carpunt.

Qualitas: herb. maxime recent. virofa, nau-
seofa, acris, halituofa. — Euaporatio,
fumus, oleum empyreumaticum, puluis
fternatorius cet.

Vis: paregorica, narcotica, phantastica, hy-
pnotica, refoluens.

Effectus: Vertigo, Cephalalgia, Stupor, Ti-
mor, Angor, Ebrietas, Vomitus, Catharsis.

39. *N. fruticosa*.

Locus: Promontorium Bonae Spei, China, vt
et India orientalis et occidentalis. *Frutex*,
mansuetus.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

40. *N. rustica*. *Blackw. t. 437. Sabb. hort. 1. t.*
90. Zorn. ic. pl. med. cent. 1. t. 33.

Locus: cum *N. Tabaco* communis. *Annua*,
cicur.

Qualitas: herb. recentis debilius halituofa,
ficcatae fortius; recent. amaricans acriu-
scula; masticat. subglutinosa, linguam fau-
cesque leuiter mordens.

Vis: antecedentibus inferior.

Effectus:

41. *N. paniculata*. *Fewill. peruv. 1. 717. t. 10.*
Act. holm. 1753. 15. 43. t. 1.

Locus: Peru. *Annua, cicur*.

Quali-

40. Idem de *N. asiatica*, vt *N. rusticae* varietate, valet,
foliis pilosioribus distincta.

Qualitas:

Vis: et

Effectus: antecedentibus ni maioris, tamen eiusdem efficaciae.

42. N. glutinosa. *Act. holm.* 1753. 43. t. 2.

Locus: Peru.

Annua, cicur.

Qualitas:

Vis:

Effectus:

} praecedentibus maiores.

ATROPA.

43. A. Mandragora. *Blackw.* t. 364. *Sabb. hort.*

1: t. 1. Mill. dict. t. 173. *Till. pis.* 108. t. 43.

Tournef. inst. t. 12. *Bulliard herb. de France* t. 145. 146.

Locus: Cretae, Cycladum, Hispaniae, Italiae, Prouinciae, Occitaniae, Heluetiae, Russiae temperatae, Sibiriae aprica. *Perennis, mansueta.*

Qualitas: rad. cort. baccar. acris, amara, nauseosa; etiam odore.

Vis: maxime rad. et cort. narcotica, phantastica, dementans, stupefaciens, purgans? pellens? resoluens, abortiua?

Effectus: Nausea, Abdominis Dolores, Animi Deliquia, Torpor, Stupor, Sopor, Furor.

44. A.

42. His forte plures eiusdem virtutis species subiungendae sunt, hodie nondum disquisitae.

44. A. Belladonna. *Fl. dan. t. 758. Iacq. austr. 4. t. 309. Blackw. t. 564. Kniph. cent. 9. t. 16. Zorn. ic. pl. med. cent. 1. t. 21. Ludw. ed. t. 128. Sabb. hort. 1. t. 3. Tournef. inst. t. 13. Bulliard herb. de France t. 29.*

Locus: Austriae, Germaniae, Angliae, Italiae, Galliae, Belgiae cet. montes syluosi. *Perrennis, cicur.*

Qualitas: venenatissima; rad. herb. subinsipida; baccar. praecipue recent. subdulcis, subadstringens; folior. herbacea, acriuscula.

Vis: rodens, narcotica, phantastica, paralytica.

Effectus: Pruritus Faucium, Deglutitio et Respiratio difficilis, Oesophagi, Intestinarum Inflammatio, Expansio, Sitis, Siccitas Oris, Vomitus, Ischuria vel Enuresis, Aluus adstricta vel sponte secedens, Arythmia Pulsus, Capitis Tumor, Pupillae Relaxatio (quam Amaurosin planta etiam externe applicata inducit), Aphonia, Insipientia in iocos et lusus erumpens, Vertigo, Mania, Sopor, Apoplexia, Languor, Tremor, Conuulsio et Paralysis omnium fere partium, Rigiditas et Gangraena vniuersalis, Mors.

45. Ph.

44. Oues herbam sine noxa carpere, suisque medicinam esse produunt.

PHYSALIS.

45. *Ph. somnifera. Lob. ic. 1. 263. f. alt.*

Locus: Mexico, Candia, Creta, Hispania, Siciliae, Malagae lapidosa. *Perennis, mansueta.*

Qualitas: rad. baccar.

Vis: rad. narcotica, opio longe mitior; fruct. valde diuretica.

Effectus: Sopor. — Gallis femina deleteria esse FORSKOHL adfirmat.

SOLANVM.

46. *S. Dulcamara. Dubam. arb. 2. t. 72. Blackw. t. 34. Ludw. ed. t. 58. Knorr. del. 1. t. H. 3. Dill. elth. 365. t. 273. f. 352. Fl. dan. t. 607. Zorn. ic. cent. 1. t. 43. Bulliard herb. de France t. 23.*

Locus: Europae sepes humentes. *Subfrutex, frequens.*

Qualitas: baccar. nauseosa, amaricans, postea subdulcescens.

Vis: anodina, repellens, pellens, diuretica.

Effectus: Vomitus, Diarrhoea.

** S.

45. Reliquarum specierum nulla venenata hucusque deprehensa est.

46. Folia ab ouibus respuuntur. Baccae triginta canem inter trium horarum spatium hyperemesi et hypercatharsi necarunt, quamvis dissecto cadauere indigestae adhuc in ventriculo reperiebantur.

** *S. Lycoperficum* ob qualitatem suam graueolentem, foetidam, qua soporem, aphoniam, apoplexiam induxisse fertur, licet fructus illius impune apud Italos aliosque in cibum veniant sale et pipere conditi, non plane insons habendum.

** *S. peruuiianum* saporis valde acris est.

47. *S. nigrum*. *Fl. dan.* t. 460. *Blackw.* t. 107. *Bulliard herb. de France* t. 67. *α. Ludw. edf.* t. 172. *Knorr. del.* 2. t. f. 3. *Sabb. hort.* 2. t. 60. *β. Dill. elth.* 367. t. 275. f. 355. *γ. Dill. elth.* 366. t. 274. f. 353. *δ. Dill. elth.* 360. t. 274. f. 354. *ε. Dill. elth.* 368. t. 275. f. 256.

Locus: Europae ruderata. *Annua, vulgarissima.*

Qualitas: fol. herbacea, subfatua.— Odo-rem moschatum, nauseosum solo sicco et aprico inhabitans spirat, inprimis altera varietas baccis flauis distincta.

Vis: refrigerans, anodina, hypnotica; baccar. diuretica.

Effectus: Capitis Grauitas, Faciei et Artuum Tremor, Ardor.

48 S.

47. Huius varietates vid. in REICHARD. *syft. pl.* t. 514.

— WEPFER refert, hanc speciem infantibus insaniam, cardialgiam, distortionem membrorum adtulisse. Ne confusio cum *Belladonna* facta sit! Pueros conuulsos fuisse, monet BOERHAAVE. Herba, aqua huius stillatitia et baccar. fues, vitulos, anates et gallinas trucidant.

48. *S. mammosum*. *Pluk. alm.* 350. t. 225. f. 1.
Merian. surin. 27. t. 27.

Locus: Virginia, Barbados. *Annua, mansueta.*

Qualitas: baccar. aurearum —

Vis:

Effectus: Ingens Tumor, Vomitus, Diarrhoea,
 Mors.

49. *S. fodomeum*. *Herm. lagd.* 573. t. 575. *Moris. hist.* 3. f. 13. t. 1. f. 15. *Pluk. alm.* 351. t. 316. f. 4?

Locus: Promontorium Bonae Spei ad fossarum margines aliisque locis incultis, et India orientalis. *Frutescens, mansueta.*

Qualitas: rad. acris, amara; maxime baccar. quarum pulpa simul viscida, nauseosa est.

Vis: rad. hydragoga; baccar. narcotica.

Effectus: Capitis Grauitas, Torpor, Dolores, Furor ipsaque Nex.

50. *S. foetidum*. *Rottböll. act. hafniens.* 1778. 287.

Locus: Surinamum.

Qualitas:

Vis:

Effectus: Baccae vulneratae foetorem spargunt intollerabilem, Nauseam et Cephalalgiam excitantem.

CAPSICVM.

51. *C. truncatum.* Rottböll. act. hafniens. 1778.
287.

Locus: Surinamum.

Qualitas: baccar. acerrima, feruida.

Vis: calidissima.

Effectus: In cubiculo concluso baccae diffectae solo, quem spirant, halitu Sternutationem, Cephalalgiam Vomitumque movent.

STRYCHNOS.

52. *St. Nux vomica.* Blackw. t. 395. Rheed. mal.
1. 67. t. 37.

Locus: Malabariae arenosa, Zeylona. *Arbor,*
peregrina.

Quali-

51. Nihilominus baccae ab Americanis loco *Piperis nigri* comeduntur. — *Capsica* omnia eadem mala, quae a vehementibus ptarmicis proficiscuntur, pariunt.

52. Decoctum radicis purgans ab Indis in febribus pituitosis, doloribus colicis, torminibus vtiliter adhiberi fertur. Cortex tusus cum oryzae decocto sumitur ad diarrhoeas biliosas tollendas; succus foliorum expressus ad capitis dolores sedandos datus, dosi iusto maiori necat. Vnicum granum vel duo quolibet mane duos per annos sumens *Colubri Naiadis* ictum, RHEEDE adfirmante, impune patitur. Vulpes, lupi, mures pleraque quadrupedia, aues, anseres cet. etiam a minori dosi seminis breui, praegressis plerumque conuulsionibus moriuntur. Suibus vero dosi sat magna nil nocimenti infert. Etiam homini maior dosi demum mortifera est; in minori, qua cetera animantia necantur, multis in morbis, hic loci non recensendis, laudantur. — Vim emeticam *Nucis vomicae* alii negant.

Qualitas: radicum cort. fol. inprimis fruct.
vnacum seminibus amara, nauseosa, acris.

Vis: emetica, diaphoretica, pellens, narcotica.

Effectus: Nausea, Hyperemesis, Sitis, Hypercatharsis, Tremor, Temulentia, Angores, Languor subitus, Arthritis, Sudor frigidus, Conuulsio (intestina etiam animale mortuo conuelluntur), Cadaver intense rigens.

53. *St. colubrina*. *Suppl. pl.* 149. *Blackw. t.* 403.
Rheed. mal. 7. 10. *t.* 5. *Rumph. amb.* 2. c. 46.
t. 37.

Locus: Malabaria, Zeylona, Timor, Solor.

Arbor, peregrina.

Qualitas: lign. rad. volatilis, acris, amarissima. Lignum exsiccatum antiquum vix toxicum.

Vis: emetica, pellens, sudorifera, fatuans.

Effectus: Tormina, Vomitus, Insensibilitas, Tremor, Conuulsio, Anaesthesia.

53. Hanc a *St. Nuce vomica* non esse diuersam, Botanici in India degentes contendunt. — Forte et *St. potatorum*, licet immaturus fructus sale et aceto conditus Bengalae sub nomine *Atschiar* in tabernis venalis sit, tamen huc referenda est. Namque maturi fructus (sapore primum dulcis, postea, amari et adstringentis), quo incolae ad turbidam aquam purificandam vtuntur, maior copia aquae vim stupefaciuam impertit, narrante Ill. R V D O L P H O fautore et praeceptore meo, quum Erlangae studiis operam darem, nunquam satis colendo, qui plures annos in India medicinam fecit.

IGNATIA.

54. I. amara. *Suppl. pl.* 149.

Locus: India, insulae Philippinae. *Arbor,*
peregrina

Qualitas: nuclei amarissima; folior. minus
amara. Flores *Iasmini* odore sunt.

Vis: narcotica, pellens, diuretica.

Effectus: Tremor totius Corporis, Pruritus,
Formicatio in specie Capitis, Vellicatio-
nes horrendae, summa Praecordiorum An-
gustia, Vertigo, Animi Deliquium, Sudor
frigidus, Vomitus et Deiectiones non
nunquam. — Motus spasmodico-con-
uulsiuos Hispanis ferme semper, Indis
non adcidere tradunt. Eadem dosi, qua
Nux vomica actiones animales suffocat, et
Ignatiae fructus feris veneno est.

CESTRVM.

55. C. nocturnum. *Dill. elth.* 183. t. 153. f. 185.
Sloan. iam. 169. *hist.* 2. 96. t. 204. f. 2. *Pluk.*
alm. 35. t. 64. f. 3. *Fewill. peru.* 2. t. 32.
f. 1.

Locus: Iamaica, Chili, Cuba. *Arbor.*

Qualitas: baccar. venenatissima: Reliqua nos
latent.

Vis:

Effectus:

56. C. venenatum. *Mill. dict.* 1. 662. n. 6. *Sloan.*
iam. 2. t. 204. f. 2.

Loc.

Locus: Iamaica.

Arbor.

Qualitas: baccar. succulentarum et rubro caeruleiscentium venenata.

Vis:

Effectus:

57. *C. vespertinum*. *Murray nov. comm. Goett.*
v. 5. 41. t. 8.

Locus: America.

Arbor.

Qualitas: antecedentium.

Vis:

Effectus:

58. *C. venenatum*. *Burm. c. 5. c. descr.*

Locus: Promontorium Bonae Spei.

Qualitas:

Vis:

Effectus: Semina contusa carnibus miscentur
a rusticis, ut feras hoc veneno enecent.
BURM. l. c.

EVONYMVS.

59. *E. europaeus*. *Iacq. austr. t. 289. Bulliard*
herb. de France t. 135. β. latifolius.

Locus: Europae sepes; Heluetia, Pannonia,
Austria. *Frutex, vulgaris.*

D 3

Qua-

57. Hoc separat a *C. diurno* MILLERVS. — Cum
C. veneuato n. 58, descripto non idem esse videtur.

59. *Euonymum* equi nunquam, pecudes, oves et caprae, nouellarum germinum etiam auidae, raro adtingunt; et tunc ad interitum suum, aut saltem nocumentum, illum deuorant. Fructus ouibus vere deleterii sunt, parvis et rubeculae vero grati.

Qualitas: lign. fol. baccar. nauseosa.

Vis: resoluens, baccar. exsiccatum antiphthiriaca, fruct. emetica, drastica.

Effectus: Nausea, Vomitus vehemens et Diarrhoea.

RAVWOLFIA.

60. *R. canescens.* *Plum. gen. 19. ic. 236. f. 2.*
Sloan. iam. 173. hist. 2. 107. t. 211. f. 1. Pluk.
phgt. 266. f. 2.

Locus: Iamaica: insulae Caribaeae cet. *Fru-*
tex, arbor.

Qualitas: tot. stirpis lactescens, acris.

Vis: venenata. BROWNE.

Effectus:

CERBERA.

61. *C. Ahouai.* *Weinmann. t. 577. litt. a.*

Locus: Brasilia, India occidentalis Hispan.
Arbor.

Qualitas: trunci et folior. lac acre foetidissimum, alliaceum.

Vis: narcotica, stupefaciens.

Effectus: a nuclei (remediis fere omnibus ridentis) Scrupulo vnico horrendi.— Tetrum lignum, quod ob foetorem, quem etiam flamma istius spargit, non comburitur,

60. Plurimae *Contortarum*, ad quas et *R. canescens* pertinet et hic recensitarum prima est, lacte acri, nauseoso, amaro scatent, quarum plures vt toxicas Indis perspectas credo.

tur, in stagna iniectum pisces temulentos et stupidos reddit, manu capiendos.

62. *C. Manghas. Rheed. mal. 1. 71. t. 39. Petiu. 90. Z. t. 16 f. 4. Burm. zeyl. 150. t. 70. f. 1. Rumph. amb. 2. 243. t. 81.*

Locus: Indiae ad aquas, America australis.

Arbor.

Qualitas: tot. arboris, inprimis fruct. acris, amara, lacte cens, venenatissima.

Vis: septica.

Effectus: Hyperemesis, Mors a nuclei etiam parua quantitate praesentanea.

63. *C. Thewetia. Jacq. amer. 48. t. 34. Pluk. alm. 253. t. 207. f. 3. Linn. B. syst. 1. 360. t. 6. f. 2. Plum. spec. 20. ic. 18.*

Locus: America australis, insulae Caribaeae, Cuba, Martiniqua.

Arbustula.

Qualitas: omnium partium lactescens, acris.

Vis: rodens, venenata.

Effectus: Caecitas a fumo ligni in foco combusti. OLDENDORP.

NERIVM.

64. *N. Oleander. Knorr. del. 2. t. N. 2. Burm. zeyl. 166. t. 77. Rheed. mal. 9. 1. t. 1. 2. Blackw.*

D 4

t. 531.

62. Folia esculenta dicuntur, praemissa forte praeparatione quadam; nam aequae ac fructus saporis sunt acris et amari.

64. Huius, ut reliquarum *Contortarum*, nectar Insectis venenum est; folia hominibus, mulis, asinis, canibus, ouibus, capris

t. 531. β. *Herm. lugdb.* 447. t. 448. γ. *Herm. lugdb.* 447. t. 449. *Comm. hort.* 1. 45. t. 23.

Locus: a Gadibus in Indiam orientalem, subhumida; nunc et America calidior, Graecia, variaeque maris mediterranei insulae.

Arbor, mansueta.

Qualitas: tot. arboris valde acris, amara; flor. odor subdulcis.

Vis:

Effectus: Angustiae intollerabiles, Ventris Tumor, vniuersi Corporis Inflammatio, Syncope, Mors.

ECHITES.

65. E suberecta. *Iacq. amer.* 32. t. 26. *Sloan. iam.* 89. *hist.* 1. 206. t. 130. f. 2.

Locus: India occidentalis: S. Domingo, Iamaica.

Frutex.

Qualitas: lactescens, acris.

Vis: emetica, drastica, anthelminthica, corrosiua.

Effectus: Gastrodynia, Nausea, Conatus Vomendi, Adpetitus prostratus. Motus convulsiui variarum corporis partium, Hectica, Mors. — Dosis ita temperari possē fertur,

capris quadrupedumque plurimis. — *Nerei diuaticati* succus viscosus, lacteus, acris mordaxque facultatem venenatam vtique arguit.

65. Succi expressi Drachmae duae canem intra octo minuta prima necant. *Ibid.* — *Echites* plures species suspectae sunt.

fertur, vt homines post aliquot dies, menses vel annos interimat. SLOAN. *Iam.* 2. *praef.* p. IX.

PLUMERIA.

66. P. rubra. *Catesb. car.* 2. 92. t. 92. *Ebret. pict.* t. 10. *Trew. Ebret.* t. 41. *Sloan. iam.* 154. *hist.* 2. 61. t. 185. f. 1. et t. 186. f. 1. *Mer. surin.* 8. t. 8. *Pluk. alm.* 109. t. 207. f. 2.

Locus: America calida, Iamaica, Surinamum.
Arbor.

Qualitas: lactescens, acris; flor. odoratissima.

Vis: septica, drastringa, venenata. BROWN.

Effectus:

CAMERARIA.

- ** C. angustifolia lac Euphorbiae instar-acre continere dicitur.

TABERNAEMONTANA.

67. T. citrifolia *Iacq. amer.* 38. t. 275. f. 13. *Plum. gen.* 18. ic. 248. f. 2.

Locus: Surinami, Iamaicae syluae.

Arbustula.

Qualitas: tot. stirpis lactescens, acerrima.

D 5

Vis:

66, Lac acre huius, vt reliquarum specierum, ferrum nigris maculis nullo modo detergendis tingit atque lintea acidum nitri instar corrodit.

Vis: exhilarans.

Effectus: Animofitas, (a maiori dofi) Rabies.

PERIPLOCA.

** P. Secamone. Ex hac planta succus flauus manat vrens, quem ficcatum Aegyptii valenter tenues humores purgare aiunt. — Omnes *Periplocae* pecoribus noxiae ducuntur.

DIGYNIA.

CYNANCHVM.

68. C. viminale. *Alp. aegypt. t. 190.*

Locus: Africa. *Frutex, peregrinus.*

Qualitas: lactescens; flor. odoratissima.

Vis: septica.

Effectus:

69. C. monspeliacum.

Locus: Hispania, Narbonae maritima.

Frutex, mansuetus.

Qualitas: lactescens, acris.

Vis: — Lac exsiccatum *Scammonio* substituitur, sed illo debilius est.

Effectus: drasticorum.

70. C. erectum. *Iacq. hort. t. 38.*

Loc.

70. Foliorum dimidia Drachma cani data, quamvis vomitu reiecta, effectus hic recensitos praeter alios adhuc edidit.

— *Cynanchis* omnibus lac acre, vesicans, drasticum inest.

Locus: Syria.

Frutex, peregrinus.

Qualitas:

Vis:

Effectus: Vomitus, Conuulsiones, Mors.

APOCYNVM.

71. *A. androsaemifolium.* *Bocc. succ. 35. t. 16. f. 3.* *Morif. hist. 3. f. 15. t. 3. f. 16.* *Dodart. mem. 59. t. 9.*

Locus: America borealis, Virginia, Canada.

Perennis, mansueta.

Qualitas: lactescens.

Vis: septica, vesicans.

Effectus: Tumor Faciei, Manuum (vel in transpirantis plantae atmosphaera se tenenti addidens), atque reliquarum partium ac Erosio.

72. *A. cannabinum.* *Morif. hist. 3. f. 15. t. 3. f. 14.* *Pluk. alm. 35. t. 13. f. 1. et t. 260. f. 4.*

Locus: praecedentis.

Perennis, mansueta.

Qualitas:

Vis:

Effectus;

ASELE.

71. Non omnibus haec planta aequè infesta est; huius enim euaporationes non nulli absque incommodo ferunt.——
Infesta e flore mortem, saepe subitam reportant.—— Etiam Apocynum venetum lac acre fouet.

ASCLEPIAS.

73. *A. gigantea.* *Iacq. obs.* 3. 17. t. 69. *Pluk. alm.* 35. t. 175. f. 3. *Rheed. mal.* 2. 53. t. 31. *Seb. thes.* 1. 41. t. 26. f. 1. *Brun. it.* 315. t. 184. *Alp. aegypt.* 85. t. 86.

Locus: Indiae orientalis, Aegypti, Arabiae humida. *Perennis.*

Qualitas: lactei succi, quo folia turgent, *Euphorbii* lacte acrior.

Vis:

Effectus: Hypercatharsis lethalis.

CHENOPODIVM.

74. *Ch. hybridum.* *Vaill. paris* 36. t. 7. f. *Tabern. hist.* 812. f. 2. *Barrel. ic.* 450.

Loc. Europae culta, rudrata. *Annua, vulgaris.*

Qualitas: folior. nauseosa, tetra, tempestate calida et frictione inprimis se manifestans.

Vis: narcotica.

Effectus: Vertigo, Visus Obnubilatio, Pulsus debilis, Pupillae Relaxatio, Tremor Artuum, Debilitas; Cutis, Labiorum, Linguae, Vnguium Liuor; Lingua mucro tenaci, flauo obducta; Icterus.

ERYN-

73. Ab ouibus, capris aliisque animalibus plantae adfuetis folia impune carpuntur; alias eadem exitiabilis illis est, ac *Anemone nemorosa.* Anni tempus et plantae aetas in census veniat forsan necesse est. — *Asclepias syriaca* Insectis lethifera est, eiusque folia cum adipe in panes cocta canes, lupos, vulpes cet. enecant — *Asclepiadis curassauicae*, cuius radix in Anglia *Ipecacuanhae* loco venditur, succus lacteus venenatus habetur.

74. Suibus lethale; etiam *CH. rubrum*, quo multi oleris instar vescuntur.

ERYNGIVM.

- ** E. foetidum, cuius herba est graueolens, nauseosa, tetra, tenacissima, aperiens, diaphoretica, purgans, diuretica et emmenagoga, suspectum est.

HYDROCOTYLE.

75. H. vulgaris. *Lob. ic. 1. 387. Fl. dan. t. 90. Lindern. alfs. t. 12.*

Locus: Europae vndata. *Radix perennis, vulgaris.*

Qualitas: acris, ardens.

Vis: irritans.

Effectus: Inflammatio, Mictus cruentus, Putredo cet.

ASTRANTIA.

- ** A. maioris radix acris purgat.

CONIVM.

76. C. maculatum. *Riu. pent. t. 64. Iacq. austr. 2. t. 16. Blackw. t. 451. et t. 573. a. b. Stoerk. suppl.*

75. Saltem oues effectibus hic enarratis planta adfcit.

76. Conium maculatum umbelliferarum, vt acrium et narcoticarum, primum toxicum est. — Vt oeconomicarum et medicinalium, sic et venenatarum vis praecipua radici et semini inest. Umbelliferarum aliae species innocentes terra humida continuo cultae demum vim sub-vel vere venenatam contrahunt; aliae virosae, earumque plurimae e. g. *Sium latifolium*, *Cicuta virosa* cet. sola exsiccatione narcotico principio

suppl. 2. t. 1. Sabb. hort. rom. 4. t. 70. Quer. fl. 4. t. 40. Zorn. ic. 1. t. 48. Bulliard herb. de France t. 53.

Locus: Europae ruderata, culta, agri.
Biennis, vulgaris.

Qualitas: plant. in primis recent. subacris, tetra; iunioris lactescens; rad. caul. cum illo radicis *Pastinacae* conueniens; semin. digitis tritorum (quae tamen interdum inodora vel subsuauecolentia sunt) et folior. foeda, nauseosa, halituosa.

Vis: narcotica, diuretica cet.

Effectus: Rigiditas, Tremor, Linguae Dolor, Alalia temporaria, Inflammatio, Ventriculi et Intestinorum Expansio, Languor, Nausea, Vomitus, Singultus, Diarrhoea, Sitis vix extinguenda, Ardor Oesophagi, Deglutitio laesa, Inflatio Abdominis, Cacorythmus, Catameniorum Obstructio, Anxietas, Tabes, Mictus cruentus, totius corporis Liuor, Paralysis, Sensuum Hebetudo, Narco-

cipio suo priuantur, et absque noxa foenum a pecoribus devoratur. Si vero relatum legimus, *Conii maculati* succum, radicem, semen impune a non nullis ingestum esse; tunc haec efficaciae diuersitas terrae, climati, plantae aetati et praeparationi, animalis conditioni et fortasse confusione cum aliis plantis tribuenda erit. — Etiam deleterium est anseribus, cuniculis, canibus, suibus cet. non ita auibus (semine auide vescentibus) et capris, quibus gratum et innocuum est. Oves et pecora herbam in pascuis spernentia, foeno admixtam impune deuorant. Etiam lupi, vulpes et muli sine sensibili noxa herba vescuntur; sed equi inde vertiginosi fiunt.

Narcosis, Caceitas, Vertigo, Dormitio, Desipientia, Melancholia, Mania, Agrypnia, Salacitas, Conuulsio, Resolutio Humorū putrescens, Sudor frigidus, Mors interdum inopinata. — Eadem fere mala externus vsus inducit. Vel odor plantae aesthetarium capit.

CACHRYS.

** C. odontalgica (*Suppl. pl. 181.*), cuius acerrima radix sialagoga quidem est, in venenorum numerum recipi nondum potest.

LIGVSTICVM.

** L. peloponense venenatum et a non nullis *Cicuta antiquorum* autumatur. Tota planta, inprimis herba, egregie foetet.

ANGELICA.

77. A. atropurpurea. *Corn. Canad. 198. t. 199.*

Locus: America: Canada cet.

Qualitas:

Vis: — Indomabile venenum praestantissima antitoxica eludens.

Effectus:

SIV M.

78. *S. latifolium*. *Fl. dan. t. 246. Iacq. austr. t. 66. Regn. bot. Sabb. hort. 4. t. 175. Riuin. pent. t. 78.*

Locus: Europae riuuli et ripae paludosae.

Perennis.

Qualitas: graueolens, amaricans, picea. Herba exsiccata pecori innocua; an et radix?

Vis: calida, stimulans, humores expandens, narcotica.

Effectus: Cephalalgia, Vertigo, Anxietas, Delirium, Insensibilitas, Mors. — Epilepticis cet. magis infensum est. — Pecora plantae huius veneno infecta in terram se abiiciunt et caput quaquauersum vergentia atque adlidentia pereunt.

OENANTHE.

79. *Oe. fistulosa*. *Morif. hist. 3. f. 9. t. 7. f. 8. Lob. ic. 731. f. 1. 2.*

Locus: Europae paludosa, fossae. *Perennis, vulgaris.*

Qualitas: plant. inprimis rad. acris, nauseosa; fruct. aromatica.

Vis: narcotica.

Effect.

78. Ante mediam aestatem radix innocua, Octobre deleteria dicitur.

79. Cadauera hoc pharmaco demortua intestinorum et sanguinis conditionem, laesionis et vitii vllius expertem ostenderunt — Et pecora *Oenanthem* spernunt.

Effectus: Languor, Cephalalgia, Vomitus, Diaphoresis, Arthritis, Distorsio Oculorum, Tetanus Maxillae, Obmutescencia, Epistaxis, Lipothymia, Stupor, Apoplexia, Mors.

80. Oe. crocata. *Blackw. t. 575. Act. angl. 1747. n. 480. t. 3. Iacq. hort. vol. 3. t. 55. Moris. 3. 288. f. 9 t. 7. f. 2. Bulliard herb. de France t. 113.*

Locus: praecedentis.

Perennis.

Qualitas: succi, quo radix et caulis scatent, crocea, acidula, foetida.

Vis: narcotica, praecedente virulentior.

Effectus: Vertigo, Arthritis, Furor, Convulsio, Trismus, Capillorum et Unguium Defluuium, interdum Cephalalgia, Cardialgia, Anxietas, Oesophagi et Ventriculi Aestus vrens, non nunquam Epistaxis, saepissime Mors. — Hypocausto inclusa odore Cephalalgiam et Fastidium producit.

PHELLANDRIVM.

81. Ph. aquaticum. *Blackw. t. 570. Riv. pent. t. 64. Regn. bot. Sabb. hort. 4. t. 72. Bulliard herb. de France t. 147.*

Loc.

80. Impune a capris haecce (nec canibus semper mortifera) carpitur. — Huius generis plures species suspectae sunt.

81. Mortem a planta illatam esse, nondum quidem constat. Attamen equis paraplegiam adfert lethabilem, minime vero, ut alii sibi falso persuadent, a *Curculione paraplectico*, qui in caule habitat, deriuandam.

Locus: Europae fossae et fluvii ampliores,
profundiores. *Biennis, vulgaris.*

Qualitas: cum primis femin. suspecta.

Vis: narcotica.

Effectus: *Conii maculati*; qui sunt: Grauitas Capitis, Vertigo, Stupor, Emesis cet.

CICUTA.

- 82 *C. virofa. Flor. dan. t. 208. Gunn. noru. 1. 26. t. 2. f. 12. Blackw. t. 574. a. b. c. Morisf. umb. 63. t. 5. Riu. pent. t. 77. Bulliard herb. de France t. 151.*

Locus: Europae paludes. *Perennis, vulgaris.*

Qualitas: tetra, acris, nauseosa, halituosa.

Vis: narcotica, hypnotica, repellens.

Effectus: Temulentia, Vertigo, Somnum capiendi Pronitas (oriunda a sola plantae evaporatione), Carus, Stupor transitorius, Languor, Desipientia, Melancholia, Rabies, Arthritis, Conuulsiones, Opisthotonus, Dentium Stridor, Epilepsia, Vomitus, nonnunquam cruentus, singultus crebri; Ardor, Distensio, Inflammatio et Erosio Ventriculi cet. Haemorrhagiae e. g. Aurium, Gangraena, Cephalalgia, Petechiae, Facium Siccitas, Catarrhus suffocatiuus, Mors, inter-

82. Huius ordinis longe venenatissima. — Non nullis animalibus interdum minus noxia fuit. — Virus teterrimum latet in succo viscido, flavescente, foetido, quo radix hyeme et prima vere turget, aestate magis aquoso. Vel caulium succus flavescent, viscidus acris est.

interdum subita. — Cadaueris Tumor stupendus, maxime Abdominis, Faciei; Liuor, saepe totius corporis; Pulmones inflammati, gangraenosi; Humores acriter resoluti; viridescens vel fusca spuma ore defluens.

83. *C. maculata*. *Pluk. alm. 31. t. 76. f. 1.*

Locus: Virginiae aquosa. *Cicur, perennis.*

Qualitas: odore et sapore *Cumini*; lactescens.

Vis: praecedente debilior.

Effectus: Vertigo, Cephalalgia — —

AETHVSA.

84. *Ae. Cynapium*. *Blackw. t. 517. Riu. pent. t.*

75. Bulliard herb. de France t. 91.

Locus: Europae sepes et inter olera.

Annua, vulgaris.

Qualitas: herb. acris; tritae graueolens, fere alliacea. Herba, radice inodora, praecipue hyemali, deterior.

Vis: narcotica.

Effectus: Anxietas, Vertigo, Delirium, Anaesthesia, Furor *)? Diarrhoea, Vomitus, Cephalalgia, Cardialgia, Tormina, Somnolentia, Intumescencia corporis, interdum Liuore maculati, non raro Mors.

E 2

CORIAN-

*) Ad hunc effectum edendum *Ae. Cynapium* debilius esse videtur. Bruta hanc plantam ferunt, anseres tamen inde occiduntur.

CORIANDRUM.

85. *C. fatium*. *Riu. t. 70. Blackw. t. 176. Ludw. eccl. t. 37. Regn. bot. Sabb. hort. 4. t. 92. Tournef. inst. 316. t. 168.*

Locus: Europae australis; Italiae agri.

Annua, cicura.

Qualitas: herb. recent. tetra, cimum instar foetida.

Vis: vaporosa, hypnotica.

Effectus: Vertigo (a sola euaporatione), Amblyopia, Raucedo, Stupor.

86. *C. testiculatum*. *Pluk. alm. 120. t. 169. f. 2.*

Locus: praecedentis. *Annua.*

Qualitas: praecedente virosior.

Vis: — —

Effectus: — — Sopor cet.

SCANDIX.

** *S. Anthriscus venenata* creditur.

CHAEROPHYLLUM.

** *C. temulentum*, iam habitu suspectum, vertiginem excitasse celeberr. PALLAS observavit.

87. *Ch. sylvestre*. *Iacq. austr. t. 149. Riu. t. 43. Morisf. umb. 47. t. 1. f. 41. hist. 3. 30. f. 9. t. 11. f. 5.*

Loc.

86. Succus epotus occidit et toto corpore *Coriandri* odore se prodit.

87. BAVHIN addit: Soporem, Anxietatem, Languorem, Furorem, Narcosin a radice hyeme effossa. An *Ch. sylvestri*

Locus: Europae pagi et pomaria.

Perennis, vulgarissima.

Qualitas: rad. acris, subaromatica; herb. amaricans, subfoetida.

Vis: narcotica.

Effectus: Delirium, Strangulatio.

88. Ch. bulbosum. *Iacq. austr. t. 63. Pluk. alm. 249. t. 206. f. 2. Riv. pent. t. 49.*

Locus: Germaniae, Hungariae, Helvetiae, Noruegiae prata humida. *Biennis, vulgaris.*

Qualitas: praecedentis. Radix interdum comeditur.

Vis: — —

Effectus: Indigestio, Cephalalgia, Vertigo, Capitis Grauitas; etiam a semine.

SESELI.

** S. tortuosum. Huius semen feruidi saporis est, linguam et fauces diu vellicans et adurens. *Seseli Turbith.* Radicis succus lacteus, acerrimus superne et inferne cum violentia purgat.

THAPSIA.

** Th. maxima *latiff. folio C. B. maxima hispanica Park. Th. salmaticensis siue 3 Clusii, magna*

E. 3

vestri tribuenda? in Russia virulentiori? Nostri in regionibus nullo scelere famosum est. Etiam bobus in Sibiria radix lethalis, et herba in Germania asinis in deliciis est, ceterum nulli animali esculenta.

gna fl. luteo, sem. lato I. B. (Raii hist. pl. t. 1. p. 419.) Vetulae Salmaticenses huius radice vtuntur ad prouocandos menses aliasque deiectiones moliendas. Tanta autem vi tum inferne, tum superne purgat, vt fumentes in maximum periculum saepe coniiciat. An *Th. foetida*. L.?

** *Th. villosae* radix succo lacteo turgens, amara, acris, subaromatica, nauseosa, purgans saepius radici *Turpithi* substituitur.

89. *Th. foetida*. Blackw. t. 459. Morisf. hist. 3. f. 9. t. 18. f. 7.

Locus: Hispania, Italia. *Perennis*.

Qualitas: rad. foetida, acris.

Vis: subnarcotica.

Effectus: Hypercatharsis, interdum lethalis; Vomitus.

90. *Th. Asclepium*. Morison. hist. 3. f. 9. t. 18. f. 9. Colum. ecphr. 1. 87. t. 86.

Locus: Apulia, Oriens. *Perennis*.

Qualitas: rad. (Sauciatae lac album, aëre in gummi coiens, fundentis) et semin. acris.

Vis: draastica, vomitoria.

Effectus: Violentae euacuationes.

91. *Th. garganica*. Magnol. monsp. 287. t. 286. Pluk. t. 67. f. 2. Gouan. illustr. 18. t. 10.

Locus: Barbaria vel Africa, Apuliae mons

Garganus.

Radix perennis.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

Effectus: Radicis succus aut decoctum superne inferneque violenter purgat.

ANETHVM.

** A. graueolentis semina Loxiae, Pyrrhylae et forte aliis auibus lethalia sunt.

PIMPINELLA.

** P. Anisi oleum stillatitium columbas subito necare dicitur, si ynica solummodo gutta rostro inditur vel caput eo oblinitur.

APIVM.

** A. Petroselinum psitacis aliisque auibus venenum est.

TRIGYNIA.

SEMECARPVVS.

92. S. Anacardium. *Suppl. pl.* 182.

Locus: Indiae orientalis deserta et syluatica. arida, versus Zeylonam. *Arbor*, peregrina,

Qualitas: succi, qui in putaminis cellulosa pulpa est, atra, mucilaginoso, acerrima.

Vis: caustica.

Effectus:

93. Rh. Vernix. *Du Ham. arb. 2. t. 99. Dill. elth. 390. t. 292 f. 377. Pluk. alm. 45. t. 145. f. 1. Kaempf. amoen. 791. t. 792.*

Locus: America septentrionalis, Carolinae, Canadae, Pensylvaniae humida, syluosa.

Arbor, mansueta.

Qualitas: ligni recent. foetidissima, igne combustum fumum spirantis venenatissimum; lactis, quod fundit ex albo flauescens, aëre vero nigrescentis viscida, acerrima. Folia aut caulem contrectans succo acri, non omnibus tamen eodem infenso, se se inficit, symptomata infra relata excitante. Sensibiliores, etiam maiori distantia remotos, toxica euaporatione sua adficit. Vere et aestate virulentior est, quam autumno et hyeme.

Vis: inflammatoria, corrodens, exanthematica.

Effectus: Cutis Tumor, Inflammatio, Motus febriles, Erysipelas bullosum, Erythma, Pruritus, Ardor, Anxietas, Agrypnia, Ophthalmia — Quae relata symptomata et vtrique sequenti *Rhois* speciei communia sunt; sed

93. Lacca vel vernix, quae ex hac arbore in Iaponia et Siam paratur, et cui planta nomen debet, artificibus ea vtentibus labiorum tumorem et cephalalgiam inducit, quam ob rem illam tractando os et nasum linteis obuelare solent. Succus huius ipsi ferro maculas nigras non nisi elimatione delendas inurit. — Lignum glaciei ad instar frigidum dicunt.

fed *Rh. Vernix*, vt reliquarum atrocissima, excitat etiam: Cephalalgiam, intensum Oculorum Tumorem, Caecitatem, Palpebrarum et aliarum partium Rigiditatem, Anginam, leuia Deliria, Lipothymiam, Convulsionem, Vlcera maligna. Etiam mortem maxime a fumo subsequutam esse referunt.

94. *Rh. radicans.* *Du Ham. arb. 2. t. 98. Dill. elth. 389. t. 291. f. 375.*

Locus: Virginia, Canada, Pensylvania.

Frutex, cicur.

Qualitas: praecedentis. Succus est ex fusco flauescens.

Vis: — — Subsequenti debilior.

Effectus:

95. *Rh. Toxicodendron.* *Munt. phytogr. t. 60. Cornut. canad. 96. t. 97. Barr. ic. 228. Bulliard herb. de France t. 143.*

Locus: Virginia, Canada aliaeque Americae septentrionalis regiones. *Arbor, cicur.*

Qualitas: antecedentium.

Vis: — —

Effectus: — — Praeter supra relata symptomata succus cuti illinitus, aliquot horis

E 5 post

95. Huius succus albus, aëre etiam nigrescens, cartas et linthea, vt ille *Rh. radicans*, maculis nigris, nullo modo eluendis et expungendis conspurcat; qui tamen cani et gallinae cum carne aliisque cibis datus vel in venam cruralem injectus nil nocuit, leuesque tantum et transitorias ille passus est vellicationes.

post illam nigram, callosam et corii instar rigidam reddit, diebus sequentibus desquamatione sanatam.

VIBURNVM.

96. V. Tinus.

Locus: Lusitania, Hispania, Italia, Gallia australis. *Arbuseula, mansueta.*

Qualitas: baccar. ardens.

Vis: drastica.

Effectus: Oris et Faucium Inflammatio, Diarrhoea torminosa.

97. V. cassinoides. *Mill. dict. 83. f. 1. Angl. hortul. 16. t. 20.*

Locus: America septentrionalis. *Frutex.*

Qualitas: folior. — —

Vis: famem sitimque ad tempus tollens, maiori dosi diuretica, drastica.

Effectus: Alui Profluuium, Vomitus, Mors.

TETRAGYNIA.

DROSER A.

98. D. rotundifolia. *Blackw. t. 432. Burm. zeyl. 207. t. 94. f. 2. Thal. herc. t. 9. f. 1.*

Locus: Europae, Asiae, Americae paludes.

Radix perennis, vulgaris.

Qualitas: herb. recent. acidula, subacris, subamaricans.

Vis: corrodens, vesicatoria, exulcerans.

Effectus:

Effectus: — — Ouibus pabulum (nec tamen, ut equidem arbitror, ob vermes — ad *Fasciolae* genus pertinentes — radici stirpis adhaerentes) emortuale. Namque oves crebro hac planta vescentes hepar et pulmones male adfectos et marcore quodam corruptos habent cum tussi lethali.

99. *D. longifolia*. *Barrel. ic. 251. n. 11. Dodon. 474. fig. exterior. Thal. herc. 116. t. 9. f. 2.*

Locus: cum antecedenti communis.

Radix perennis, varior.

Qualitas:

Vis: et

Effectus: antecedentis.

CASSINE.

** *C. Peragua*. Foliorum, quorum intensa amarities diu inhaeret, infusum aquosum in cardialgia, adpetitu prostrato cet. bibitur; sed fortius paratum emeticum est et vehementer purgans.

SAMBUCVS.

** *S. nigrae* baccae gallinis lethiferae sunt.

** *S. racemosa* soporifera et viribus *Belladonnae* congruens fertur. An verum?

CLASSIS VI.
 HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

BROMELIA.

- ** Br. Ananatis fructus vel aqua, vel vino maceratus adeo rodens non est, ut calore suo palatum et linguam exulceret bullasque in illis excitet. Abusus incurabilem dysenteriam producere valet.

LEVCOIVM.

- ** L. vernalis floribus, cum primis bulbo, vis est resoluens, vomitoria, sudorifera, deobstruens.

NARCISSVM.

- ** N. pœeticus vomitorius neruisque inimicus dicitur.
- ** N. Pseudonarcissi bulbus emefin, coctus vero catharticum mouet.
- ** N. Tazetta Iaponensibus venenata habetur. *Thunb. iap.* 131.
- ** N. Ionquilla. Fortis florum odor obstupefacit.

PANCRATIVM.

- ** P. zeylanicum. In Iava radix, in primis illius varietatis, cui flos est flauus, concisa aliisque cibis immixta et canibus data illis perniciofa est. Excidunt nimirum canibus dentes, quo facto fame pereunt. Idem et *P. zeylan. flore albo* effecere obseruatum est.

** P.

- ** *P. maritimi* et *amboinensis* bulbus emeticus est.

CRINVM.

- ** *Cr. asiatici* fibrae carnosae vehementes vomitus cum sudore cient.

AMARYLLIS.

100. *A. farniensis*. *Corn. canad.* 157. t. 158.
Rudb. elysf. 2. 23. f. 14. *Ehret. select.* t. 9. f.
 3. *Seb. mus.* 1. t. 17. f. 3. *Dugl. monogr.* t. 1.2.
Locus: Iaponia, Sarnia. *Perennis.*

Qualitas:

Vis: Venenata THVNB. Iap. 132.

ALLIVM.

- ** *Al. satium* causticum, vesicatorium, corrodens est. Abusus capitis dolorem et sitim excitat, oculis nocet sensuumque omnium instrumentis. Succus potus hominem non modo turbasse, sed etiam interfecisse traditur. *A. canadense* ob vehementem odorem etiam viribus *A. satiuo* anteire videtur.

FRITILLARIA.

101. *F. imperialis*. *Knorr. del.* 1. t. *K. Reg. bot.*
ic. Mill. dict. t. 104.

Locus: Ex Oriente in Europam venit.

Perennis, cicur.

Qualitas: tot. plant. recent. nauseosa, acris.
 (Radice, ut venenatissimae partis fecula,

a

101. Floris nectare Turcae ad vomitum mouendum, feminae ad foetum excludendum vtuntur; et apes inde inebriantur.

a rodente succo purificata, innocua editur).
 Florum nect̃ar dulce.

Vis: subnarcotica, irritans, rodens.

Effectus: Languor, Vomitus, Conuulsiones,
 Inflammatio partium internarum, Putredo
 cet. *vid. Effect. Conii maculati.*

- ** *Fritillaria Meleagris* teterrimi odoris est, cui
 similem putidissimum ouum spirat. In iuue-
 ne haemorrhagiam odore suppressam obser-
 varunt.

GLORIOSA.

102. *G. superba. Herm. lugdb. 688. t. 689. Pluk.
 alm. 249. t. 116. f. 3. Comm. hort. 1, 69. t. 35.
 Rheed. mal. 7. t. 107. f. 57. Rudb. elysf. 2.
 178. f. 7.*

Locus: Malabaria. *Perennis, peregrina.*

Qualitas: rad. acris? nauséoso-amara.

Effectus: parua quantitate lethalis est. HERM.
 BVRM. *ind. p. 82.*

- ** *G. simplex* ob foliorum fortem, ingratum
 odorem atque adfinitatem quoque veneni
 criminatur.

SCILLA.

103. *Sc. maritima. Blackw. t. 591. β. Seb. musf. 1.
 t. 44. f. 4. 5. Besl. eyf. vern. 35. f. 1.*

Locus:

102. Gallinae pane, quo bulbus *Scillae* circumdatus in fur-
 no torrebatur, deglutito expirauere omnes. Succus catulis
 et cuniculis exitialis est. — Siccatione remanet amarities,
 perditur acredo.

Locus: Hispaniae, Lusitaniae, Galliae orae meridionales, circa insulas Balearicas, Italiae superior pars, inprimis Neapolis, Sicilia, Apulia, Africae septentrionalis orae, insulae Graecae, Syria.

Perennis, submansueta.

Qualitas: rad. mucosa, exquisite amara, acris; crudae corrosiva. Recens radix tusa volatilem acredinem spirat, oculis et naso molestam.

Vis: incidens, stimulans, organica, pellens, diaphoretica, diuretica, hydragoga cet.

Effectus: Vomitus, saevi Dolores, Convulsiones, Ventriculi Robur deiectum, Resolutio Sanguinis.

ASPHODELVS.

** A. fistulosi radix acerrima est, quae licet externe ut causticum adhiberi posset interneque ut diureticum aut emmenagogum non tuto propinetur, tamen a suis effoditur et deuoratur.

ALOE.

104. A. spicata. *Suppl. pl. 205.*

Locus: Promontorium Bonae Spei. *Perennis.*

Qualitas: succi inspissati gummi - resinosa, amarissima, nauseosa.

Vis: purgans, pellens.

Effectus: Hypercatharsis, Mictus cruentus cet.

ANTHE-

104. Omnium haec optimam largitur gummi - resinam, reliquae species viliorem — Huc et A. *perfoliata* unacum varietatibus suis aliaeque pertinent.

ANTHERICVM.

** *A. aloides*. Radicis mucus albus albumen referens, initio plane insipidus, mox linguae imprimit ardentis acredinis sensationem.

** *A. ossifragum* ob odorem virosum et tabem (non enim credibile est, ossa animalium ab hac planta emolliri, vt non nulli quidem existimant), quam herba pabulo intermixta pecoribus inferre dicitur, vt pedibus insistere nequeant, malignae indolis suspicionem init. Alii folis ouibus nocium habent; non vero armentis aliisque pecoribus.

ORONTIVM.

** *O. aquatici* radix, quae cineribus tosta Americanis syluestribus cibo est, cruda ob acredinem hominibus toxifera habetur. Semina quoque, quae bene ficcata et cum aqua aliquoties cocta ferculum exhibent, cruda acerrima sunt.

TRIGYNIA.

COLCHICVM.

105. *C. autumnale*. *Tournef. inst. R. H.* 348.
t. 381. *Blackw. t.* 566. *Knorr. del. t.* 2. 1.
Zorn. ic. med. t. 133. *Bulliard herb. de France t.* 17.

Locus: Europae australioris prata succulenta.
Perennis, cicur.

Qualitas: totius plant. amara, acris; rad. succulentae simul graueolens, hircina, salivam amaritiae inquinans, recens resectae nares et fauces feriens; feculae iners; flor. inodora.

Vis: narcotica, phantastica, caustica, inflammans, diuretica, draastica.

Effectus: Pharyngis Constrictio, Linguae Rigiditas ac Insensibilitas, Labiorum Ardor, Ptyalismus, Vomitus, Diuresis dolorosa, summus Languor, Tormina, Cephalalgia, Singultiendi Conatus, Sitis inextinguibilis, Appetitus prostratus, Tenesmus, Alui Fluxus, Arthritis, Palpitatio Cordis, Anxietas, copiosus Sudor foetidus, viscidus, Mors.

POLY.

105. *C. autumnale* potissimum aestatis initio deleterium est. — Cerui, pecora et canes radice, atque homines etiam feminibus deglutitis, et gallinae odore illorum perierunt. Radicis Vnciae duae canem caecum reddebant; et Vncia di-
 midia alium cum vomitu et diarrhoea necabat.

POLYGYNIA.

ALISMA.

106. A. Plantago aquatica. *Fl. dan. t. 561.*

Locus: Europae aquosa, ripae et lacus.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: fol. inprimis iuniorum acris.

Vis: vesicans.

Effectus: Pecora et alia bruta occidit.

CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

GVAREA.

107. *G. trichilioides*. *Iacq. amer.* 126. t. 176. f. 37. *Plum. gen.* 4. ic. 147. f. 2. *Pis. bras.* 79. t. 80.

Locus: America calida, Brasilia aliiue Indiae occidentalis montes syluosi. *Arbor.*

Qualitas:

Vis: succus corticis emeticum et purgans violentum. *AVBL.* 394.

Effectus:

AMYRIS.

- ** *A. toxifera* an inter deleteria suscipienda? Hoc nullis adhuc obseruationibus comprobatur. Saltem aues baccas huius rubras impune deglutunt; nec succi nigri, quo scatet, effectus prauus constant.

DAPHNE.

108. *D. Mezereum*. *Fl. dan.* 268. *Ludw. ed.* t. 63. *Kniph. cent.* 1. t. 23. *Knorr. del.* 1. t. K. 6. F 2 *Blackw.*

108. Pecora, lupos, canes enecant baccae; floresque ab apibus fugiuntur. — *Daphnes* species qualitatibus inter se conueniunt omnes, septicae sunt; plures itaque hic tractandae fuissent, si effectus illarum cogniti essent.

Blackw. t. 582. Zorn. ic. f. 3. Bulliard herb. de France t. 1.

Locus: Europae borealis et australis sylvae umbriferae. *Frutex, cicur.*

Qualitas: totius plant. maxime baccar. insipida, tunc acris, mordens; flor. suaueolens, stupefaciens.

Vis: rubefaciens, corrodens, excorians, stimulans, pellens.

Effectus: Oris, Pharyngis, Oesophagi Ardor, Inflammatio, Sitis non restinguenda, Febris ardens, Haemorrhagia, Vomitus pertinax, totius corporis Excoriatio, Ventris Fluxus cruentus, Mors.

109. D. Thymelaea. *Ger. prov. t. 17. f. 2. Pluk. alm. 366. t. 229. f. 2.*

Locus: Hispania, Italia, Monspeli Hortus Dei. *Frutex, mansuetus.*

Qualitas: praecedente deterior.

Vis: — —

Effectus: — Ni mortem iam intulerit, illam tamen efficere valet.

110. D. Tarton — raira. *Lob. ic. 371.*

Locus: Italia, Galloprovincia. *Frutex, mansuetus.*

Qualitas: praecedentium.

Vis:

Effectus:

111. D. alpina. *Gesn. fasc. 6. t. 3. f. 7. Barr. ic. 234. β. Rai. hist. t. 588. Pluk. alm. 366. t. 229. f. 3.*

Locus:

Locus: Heluetiae, Geneuae, Italiae, Austriae
alpes. *Frutex.*

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

112. D. Laureola. *Iacq. austr.* 2. t. 183. *Blackw.*
t. 62. *Gesn. fasc.* 1. 7. t. 6. f. 9. *Bulliard.*
herb. de France t. 37.

Locus: Hispania, Italia, Anglia, Gallia, Helue-
tia. *Frutex, mansuetus.*

Qualitas: *Mezerei.* Oleum baccarum ex-
pressum (quod externo illarum cortici
acre principium debere videtur) mite pri-
mum, tunc anginam excitans plures horas
durantem.

Vis:

Effectus: Alui Obstructio cet.

113. D. pontica. *Tournef. itin.* 3. 180. t. 180.

Locus: Pontus. *Frutex.*

Qualitas: reliquarum, acerrima.

Vis:

Effectus:

114. D. Cneorum. *Pollich. pal. n.* 380. t. 1. f. 4.
Iacq. austr. t. 424. *Gesn. fasc.* 5. t. 3. f. 6.
Du Ham. arb. 2. t. 94. *Bulliard herb. de*
France t. 121.

Locus: Heluetia, Hungaria, Austria, Pyrenaci
montes, Baldum, Gallia, Germania, Palati-
natus. *Frutex.*

Qualitas: praecedentium. Flor. odor fortis,
gratus.

Vis:

Effectus:

115. *D. Gnidium.*

Locus: Hispania, Italia, G. Narbonensis, Languedocia. *Frutex.*

Qualitas: reliquarum, acerrima; flor. suaveolens.

Vis:

Effectus:

PASSERINA.

116. *P. hirsuta. Breyn. cent. t. 19.*

Locus: Galloprovincia, Italia, Lusitania, Hispania, Oriens. *Frutex, mansuetus.*

Qualitas: totius plant. acerrima.

Vis: draistica cet.

Effectus: *Daphnes.*

117. *P. ciliata. Burm. afric. 129. t. 47. f. 2. Seb. mus, 2. 15. t. 12. f. 9.*

Locus: Libanon, Promontorium. Bonae Spei, Aethiopia, Lusitania, Hispania. *Frutex.*

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

POLYGONVM.

** *P. Hydropiper* aequè minus, ac *Sedum acre* (quod tamen priori acrius est) venenorum; sed medicamentorum potius numero adscribendum est.

COCO-

COCOLOBA.

** *C. emetica* (*Rottboell act. Hafniens. 1778. 289.*)
cuius liber et flores praestans decoctum emeticum praebent, cortex autem vulneratus halitum nauseosum spirat, suspecta est.

PARIS.

** *P. quadrifolia* odoris suspecti est, et baccae gallinis atque aliis aibus lethales sunt; hominibus mouent ventriculi spasmos et vomitus; an etiam mortem intulerint? incertum est.

CLASSIS, IX.

ENNEANDRIA.

MONOGYNIA.

ANACARDIVM.

118. *A. occidentale.* *Iacq. amer.* 124. t. 181. f. 35. *Tournef. inst.* 658. t. 435. *Blackw. t.* 369. *Catesb. car.* 3. t. 9. *Rumph. amb.* 1. 177. t. 69. *Mer. surin.* 16. t. 16. *Rheed. mal.* 3. 65. t. 54.

Locus: India occidentalis et orientalis, Americae calidae insulae; Surinamum, Jamaica. *Arbor.*

Qualitas: olei nigri, in nucis putamine contenti, caustica.

Vis: vesicans.

Effectus: Inflammatio, Dolor acutus cet.

CLASSIS X.
DECANDRIA.

MONOGYNIA.

ANAGYRIS.

119. A. foetida.

Locus: Hispaniae, Italiae, Siciliae, Galloprovinciae, Languedociae montes, vt et Smirna in Asia minori, Candia, aliaeque Archipelagi insulae. *Frutex vel arbor.*

Qualitas: totius stirpis, imprimis foliorum contritorum halituosa, putidissima; sem.—

Vis: emmenagoga.

Effectus: (a semine commanducato) Vehementes Vomitiones. In Creta solo odore Capitis Grauitatem infert,

BAVHINIA.

120. B. coccinea. *König im Naturforsch. 21. St.*

Locus: Indiae orientalis regiones orientiores.

Qualitas: sem. amaricans.

Vis:

Effectus: Dysenteria lethalis.

F 5

**B.

119. Casei confecti ex lacte caprarum vel ouium, quae fame vexatae folia depascebant, tum vehementissimos vomitus, tum fluxus ventris excitant, sic vt in vitae discrimen veniat aegrotus. — Flores apes non adtingunt.

120. Eduntur semina a Peguanis in aqua decocta, quae particulas venenatas extrahit et deinde abiicitur,

** *B. variegatae et purpureae flores purgant.*

POINCIANA.

** *P. pulcherrimae folia purgant et flores, quorum odor et sapor nauseosus est, aqua infusi. Testante celeberrima MERIANA feminibus mancipiorum feminae vt medicamento abortiuo vtuntur.*

GVILANDINA.

121. *G. Moringa. Burm. zeyl. 162. t. 75. Rheed. mal. 6. 19. t. 11. Rumph. amb. 1. 184. t. 74. 75. Blackw. t. 386.*

Locus: Asia: Syria, Arabia, Aegyptus, Zeylona, Malabaria; America.

Arbor, peregrina.

Qualitas: nuclei fruct. acris, amara, ingrata.

Vis: pellens, resoluens.

Effectus: Nausea, Vomitus, Deiectio Alui molestissima, Virium Prostratio, Sudor frigidus.

CYNOMETRA.

** *C. ramiflorae radix acris purgat.*

TRICHILIA.

** *T. trifoliatae partes omnes debiliter foetent. Nigritarum feminae vernaes decocto, quod ex radice parant, abortum sibi procreant.*

MELIA.

MELIA.

122. *M. Azedarach*. β . *Tournef. inst.* 616. t. 387.
Rheed. mal. 4. 109. t. 53. *Comm. hort.* 1. 147.
 t. 76. A.

Locus: Syria, Hispania, Lusitania, Malabaria,
 β Zeylona Arbor.

Qualitas: ligni et folior. foetida, amara; fructus carnosus simul dulciaria.

Vis: venenata; rad. purgans.

Effectus: — Caro fructus adipe mixta canibusque oblata necat.

LIMONIA.

- ** *L. acidissimae* radix purgat.

KALMIA.

123. *K. latifolia*. *Catesb. car.* 2. t. 98. *Trew. ebret.*
 t. 38. f. 1. *Pluk. alm.* 49. t. 379. f. 6.

Locus: Marilandia, Virginia, Pensyluania.

Frutex vel arbuscula.

Qualitas: folior. —

Vis:

122. Fructus totam per hyemem arbore, ab aëribus spre-
 ti, manent. — Etiam *M. Azadirachta* huius indolis esse
 videtur; fructus enim caro oleosa, amara et acris est.

123. Vtriusque *Kalmiae* folia animalibus domesticis, ut
 ovibus, vitulis, equis, bobus, vaccis aut lethalia, aut admo-
 dum noxia sunt; contra sylvaticis, ac praecipue cervis, gratum
 atque salubre pabulum: tamen foliis his pasti animalis caro
 canibus exhibita lethifera iis infert symptomata. Eaque vel
 homini exitialia esse posse, verosimillimum est.

Vis: emetica.

Effectus: Vertigo, Stupor, Cephalalgia.

124. *K. angustifolia*. *Catesb. car.* 3. t. 17. f. 1.
Trew. ehret. t. 38. f. 3. *Pluk. alm.* 106. t.
 161. f. 3.

Locus: Pensylvania, Noua Caesarea, Noue-
 boracum. *Frutex.*

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

LEDVUM.

125. *L. palustre*. *Lob. ic.* 2. p. 124.

Locus: Sueciae, Septentrionis, Poloniae, Bo-
 hemiae, Silesiae paludes asperae.

Frutex, vulgaris.

Qualitas: herb. amaricans, halitiosa, nido-
 rosa.

Vis: Narcotica, phantastica, phthiriaca.

Effectus: Vehementissima Cephalalgia, Ver-
 tigo, Narcosis, forte in maiori dosi Mors.

RHODODENDRON.

126. *Rh. ferrugineum*. *Iacq. obs.* 1. 26. t. 16. et
austr. t. 255.

Locus: Alpes Helueticae, Allobrogicae, Py-
 renaeae, Sibiricae, Austriacae. *Frutex.*

Qualitas:

Vis: narcotica.

Effect.

125. Oues spernunt *L. palustre*.

Effectus: Lepus, plantae huius foliis deuoratis mactatus et praeparatus, cibum prae-
buit omnibus mortiferum.

127. Rh. chrysanthum. *Suppl. pl.* 237. *Pall. it.* 3.
729. *t. N. f.* 1. 2. *Gmel. Sibir. v.* 4. 121. *t.* 54.

Locus: Dauriae totiusque Sibiriae iuga alpina frigidissima. *Frutex, peregrinus.*

Qualitas: folior. acriuscula, austera, adstringens, amaricans.

Vis: subcalesfaciens, inebrians, hypnotica, (exanthematica, phthiriaca).

Effectus: Vertigo, Temulentia, Stupor, Anxietas, Dyspnoea, Ataxia Pulsus, Ardor et Constrictio Oesophagi, Sternutatio, Motus conuulsiui, Extremorum Frigus.

128. Rh. ponticum.

Locus: India orientalis, Gibraltariae subhumida, umbrosa. *Frutex.*

Qualitas: praecedentium. Mel venenatum suggerere dicitur.

Vis:

Effectus:

PHYTOLACCA.

129. Ph. decandra. *Blackw. t.* 515. *Dill. elth.* 318.
t. 239. *f.* 369. *Pluk. alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

Loc.

127. Non dubium est, plantam recentem viribusque suis adhuc scatentem et dosi maiori adhibitam, morti inferendae parem esse. Idem Rh. *dauricum* concernere videtur, Rh. *chrysantho* adeo similem, ut (*Suppl. pl.* 237.) hoc prioris *varietas* habeatur.

129. Ph. *decandra*. Succus baccarum (quae ceterum aui cuidam in America cibo sunt et ab infantibus absque detrimento

Locus: Virginia, Heluetia, Hispania.

Perennis, mansueta.

Qualitas: plant. tenellae aquosa, oleracea;
adultae acris.

Vis: corrodens; succi, maxime rad. pur-
gans.

Effectus: Conuulsio.

mento deglutiuntur) cani datus leuiores conuulsiones et tu-
mores excitauit.

CLASSIS XI.
DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

ASARVM.

130. *A. europaeum*. *Fl. dan.* t. 633. *Mill. dict.* n. 1. t. 53. f. 1. *Ludw. ect.* t. 182. *Zorn. ic.* t. 74. *Blackw.* t. 383. *Bulliard herb. de France* t. 69.

Locus: Europae australioris vmbrosa; Scania.
Perennis, cicur.

Qualitas: rad. herb. amaro-acris, nauseosa; masticatarum in lingua et faucibus leniter mordens; folior. eminentior.

Vis: praecipue recentis plantae vomitoria, purgans, diuretica, diaphoretica, emmenagoga, errhina.

Effectus: — Mors.

- ** *A. canadense* (cuius semen acre et calidum est) et virginicum, quod *A. europaeum* odore et sapore adprime refert, iisdem viribus esse videntur.

BOCCONIA.

- ** *B. frutescens*, quae tota acerrimo succo flavo, verrucas exurente, turget, suspecta est.

PEGA-

PEGANVM.

** P. Harmala. Totius plantae odor fortis, ingratus, foliorum sapor resinofus, amarus, subacris est. Seminibus, quae interne sumta inebriant, Turcae procures delectantur.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA.

131. E. antiquorum. *Blackw. t. 339. Comm. hort. 1. 23. t. 12. Rheed. mal. 2. 81. t. 42. Comm. prael. 55. t. 5.*

Locus: India orientalis, Arabia. *Frutex, ferus.*

Qualitas: plant. lactescens, mucofo-resinofa, acris.

Vis: feptica, rubefaciens, veficans, exulcerans, ftimulans, pellens, draftica, fternutatoria.

Effectus: *Externe* Erofio Solidorum, etiam Offium, Tumor, Inflammatio, Dysuria; *interne* Arthritis periodica, Hyperemefis, Hypercatharfis cruentae, Ardor Oefophagi, Inflammatio, Sitis non leuanda, Haemorrhagiae, Hydrops, Sudor frigidus, Lipothymiae, Mors.

132. E.

131. Hanc FORSKOHL in Aegypto a camelis deuoratam effe magna cum admiratione vidit. — Vel reliquarum multas, quae hic defiderantur, fpecies toxica acredine (exoticas, quas etiam *Sphinx Euphorbiae* fpernit, noftratibus magis concentrata) turgere, extra dubitationis aleam pofitum eft. Potiffimum lac (multis quoque infectis deleterium) princi-

132. *E. canariensis*. *Blackw. t. 340. f. 1. Comm. hort. 2. 207. t. 104. Pluk. alm. 370. t. 320. f. 2.*

Locus: Canariae.

Frutex, ferus.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

133. *E. officinarum*. *Blackw. t. 340. f. 2. Isnar. act. 1720. 500. t. 10. Comm. hort. 1. 21. t. 11. Seb. thes. 1. 29. t. 19. f. 2.*

Locus: Arabia, Aethiopia et Africa calidior.

Praeced.

Qualitas: Gummi - resinae vix odora, primum insipida, tunc valde punctoria, fere vt radix *Ari*, sed feruida infimul, calida, nauseosa, diu inhaerens. Praecedente acrior ab Arabibus habetur.

Vis: praecedentium.

Effectus:

134. *E. neriifolia*. *Seb. thes. 1. 18. t. 9. f. 1. Comm. prael. 22. 56. t. 6. Bradl. succ. 3. 10. t. 28. Comm. hort. 1. 25. t. 13. Rumph. amb. 4. 88. t. 40. Rheed. mal. 2. 83. t. 43.*

Locus: Indiae aquosa, insulae: Iaua, Baleya cet.

Frutex.

Qualitas: totius plant. (lacte, quod ea leuiter modo vulnerata exstillat, copioso, viscido, adstringente refertae) primum vix sapida,

principium acre continet. Planta antiquior vel vino sive aceto infusa minus nociva est.

sapida, dein sensibilem ardorem inprimens. — Folia atque cortex succo viridi scatent.

Vis:

Effectus:

135. *E. mauritanica*. *Dill. elth.* 384. t. 289. f. 373.

Locus: Africa maritima. *Praeced.*

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

136. *E. Tirucalli*. *Comm. hort.* 1. 27. t. 14. *Pluk. phyt.* 319. f. 9. *Rumph. amb.* 7. 62. t. 29. *Rheed. mal.* 2. 85. t. 44.

Locus: Arabia, India orientalis. *Praeced.*

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus: — Lac huius oculis admodum excoecare Arabes produnt.

137. *E. tithymaloides*. *Iacq. amer.* 149. t. 92. *Herm. parad.* 234. f. 234. *Comm. hort.* 1. 31. t. 16. *Pluk. alm.* 369. t. 230. f. 2. β . *Dill. elth.* 383. t. 288. f. 372.

Locus: Curacao, at β . forte India. *Praeced.*

Qualitas: succi lactei amaricans, acerrima.

Vis: vesicans cet.

Effectus:

137. Medici Curassauici decoctum plantae, inprimis caulibus, saturatum in syphilitide pro potu ordinario propinant; et feminae Americanae idem in mensium obstructione adhibent.

Effectus: — Lac per cruentum vulnus immis-
sum necat.

** E. *Ipecacuanhae Americae septentrionalis incolae* ut emetico utuntur.

138. E. *Peplus*. *Weinmann*. 492. *Ruin. tetrap.*
t. 118. Bulliard herb. de France t. 79.

Locus: Europae culta oleracea.

Annua, vulgaris.

Qualitas: antecedentibus debilior.

Vis: — — Radic. et semin. hydragoga.

Effectus: Haec Species, insequens et *helioscopia* (cuius lac HALLERVS salitum, ceterum sine acredine esse dicit) et *Cyparissias* reliquis mitiores sunt.

139. E. *exigua*. *Fl. dan. t. 592. α. E. exigua acuta.* *Lob. ic. 357. β. E. exigua retusa. γ. Magn. monsp. 259. t. 258.*

Locus: Lusitania, Italia, Gallia, Heluetia, Hispania, Germania inter segetes, in collibus et pratis.

Annua, vulgaris.

Qualitas: Omnium hic recensitarum debilissima.

Vis: drastica.

Effectus:

140. E. *Lathyris*. *Blackw. t. 123. Weinmann. 490.*
a. b. Zorn. ic. pl. med. t. 19. Bulliard herb. de France t. 103.

Locus: Galliae, Italiae, Heluetiae, Austriae, Germaniae, Carnioliae agri. *Biennis, cicur.*

Qualitas: lactis primum insipida, tunc vero acerrima; semin. pinguis, subdulcis, acris, nauseosa.

Vis: vesicans cet.

Effectus: Vehementissimae Euacuationes sursum deorsumque.

** *E. Apios*, inprimis radix illius carnosa, fuculenta valde purgat, nec minus *E. aleppicae* lacteus latex.

141. *E. helioscopia*. *Fl. dan. t. 725. Weinmann. 489. d.*

Locus: Europae culta. *Annua, vulgaris.*

Qualitas: reliquarum, amara. Semina innocua dicuntur.

Vis:

Effectus: — Pecorum, quorum alia plantam impune deuorant, alia diarrhoeis cet. inde adficiuntur, lac et caro saporem foetidum consciscere fertur.

142. *E. ferrata*. *Bulliard herb. de France t. 75.*

Locus: Narbona, Hispania, Italia, Oriens.

Annua.

Qualitas: acris.

Vis: caustica.

Effectus: Inflammatio, Vlcus cet.

143. *E. platyphyllos*. *Iacq. austr. t. 376. Moris. hist. f. 10. t. 3. f. 1.*

Locus:

143. Odor fastidiosus et familia locum huncce, monente Cl. GMELINO, iure huic plantae concedunt.

Locus: Galliae, Angliae, Germaniae, Austriae,
Heluetiae, Palatinatus agri. *Annua, vul-*
garis.

Qualitas: antecedentis.

Vis:

Effectus:

144. E. Esula. *Blackw. t. 163. f. 1. 2. Weinmann.*
t. 487. d. Riwin. tetrap. t. 227.

Locus: Germaniae, Belgii, Galliae, Heluetiae,
Carnioliae, Arabiae sterilia, colles.

Perennis, vulgarissima.

Qualitas: rad. folior. femin. quae praecedentium; inodora.

Vis: vesicans cet.

Effectus: *Extern.* Ardor, Inflammatio, Ero-
sio, Tumor ingens, Gangraena; (*succi ex-*
pressi oculo adplicati) Ophthalmia, Caeci-
tas; *intern.* Hypercatharsis, Haemoptoe,
Mors.

145. E. Cyparissias. *Blackw. t. 163. f. 3. Wein-*
mann. t. 487. Iacq. austr. vol. 5. t. 435. Riv.
tetrap. t. 113. Bulliard herb de France t. 97.

Locus: Germaniae, Bohemiae, Heluetiae, Gal-
liae Narbonensis colles.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: antecedente minus efficax, vehe-
mentior tamen, quam E. helioscopiae.

Vis:

G 3

Effectus:

144. Folia a capris carpta, lac purgandi vi inquinare, ad-
firmant. Semina pisces stupefaciunt.

Effectus: a *semin.* Alui profluuium, Spasmus,
Inflammatio cet.

146. *E. myrsinites.* *Barr. ic.* 1200.

Locus: Calabria, Hispania, Italia, Monspe-
lium. *Perennis.*

Qualitas;

Vis:

Effectus: Succus vehementius aluum purgat.

147. *E. palustris.* *Morif. hist. f.* 10. *t.* 2. *f.* 1.

Weinmann. 48. 8. *t.* *Riwin. tetrap. t.* 230.

Bulliard herb. de France t. 87.

Locus: Suecia australis, Germania, Belgium,
Heluetia, Oelandia, Gotlandia.

Perennis, cicur.

Qualitas: reliquarum.

Vis:

Effectus:

148. *E. hiberna.* *Dill. elth.* 387. *t.* 209. *f.* 374.

Locus: Hibernia, Sibiria, Austria, montes Py-
renaei. *Perennis,*

Qualitas: acerrima cet.

Vis:

Effectus: — Radix tusa aquae inspersa pi-
sces necat.

149. *E. amygdaloides.* *Weinmann. t.* 488. *c.* *Ri-
win. tetrap. t.* 227.

Locus: Angliae, Galliae, Germaniae? Au-
striae, Hungariae, Heluetiae syluae.

Qualitas: rad. maxime *femin.* quae reliqua-
rum,

Vis:

149. An *E. syluaticae* varietas?

Vis:

Effectus: radic. Vomitus, Ventris Fluxus.

150. *E. syluatica. Iacq. austr. t. 375. Col. ecphr. 2. 56. t. 57. Moris. hist. 3. f. 10. t. 1. f. 3. Bulliard herb. de France t. 95.*

Locus: Europae australioris, Heluetiae, Austriae, Palatinatus syluae vmbrosae, humidiusculae.

Frutex.

Qualitas: reliquarum; foetida cet.

Vis:

Effectus:

151. *E. characias. Weinmann. t. 488. c.*

Locus: Gallia, Hispania, Italia, Germania.

Frutex.

Qualitas: rad. folior. semin. vrens, vt ceterarum.

Vis:

Effectus:

151. Est *E. syluaticae* et *amygdaloidi* valde adfinis.
-

CLASSIS XII.
ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

PRVNVS.

152. *P. Laurocerasus.* *Blackw. t. 512. Cam. hort. t. 23. Du Ham. arb. 1. t. 133. Zorn. ic. t. 96. Bulliard herb. de France t. 153.*

Locus: Trapezunt. *Arbor, mansueta.*

Qualitas: foliorum aquae destillatum maxime repetita abstractione concentratae, suaueolens, amara.

Vis: narcotica, resoluens, diuretica.

Effectus: Vertigo, Dolores Artuum, Irritabilitatis Intentio, tunc Abolitio, Sanguinis Resolutio, Mors.

152. Animalia carniuora aliis peiores inde experiuntur effectus. Aquae destillatae Vnciae quatuor maximum canem pulsu frequentiori et conuulsionibus praegressis necarunt. Baccas tamen aues deglutiunt; et homines quoque magna illarum copia sine noxa vesci possunt. — *Amygdali communis amarae* fructus tum odore, tum sapore adeo cum *Laurocerasi* foliis conuenientes, licet nulli homini, tamen canibus, lupis, vulpeculis, felibus, psitacis cet. venenum fuere. Gallinae ex esu magmatis, expresso oleo superstitis, interierunt. Flores *Amygdali communis* recentes non alium modo deiciunt, sed et vomitiones cient atque hydropicorum aquas pellunt in acetariis citati, non autem absque aegrotantium labore.

CLASSIS XIII.

POLIANDRIA.

MONOGYNIA.

CARAIPA.

153. *C. angustifolia*. Schreber. *Naturf.* 19. 152.

Aubl. guian. 562. t. 224. f. 4.?

Locus: America australis. *Arbor.*

Qualitas: frond. graueolenti-aromatica, *Verratri nigri* odorem imitans, subacris.

Vis:

Effectus: — Toxicum sagittarium? suspecta est.

ACTAEA.

154. *A. spicata*. *Fl. dan.* t. 489. *Blackw.* t. 565.

Bulliard herb. de France t. 83. β . *Corn. canad.* 76. t. 77. *Morif.* 2. f. 1. t. 2. f. 7.

Locus: Europae, β . Americae nemora.

Perennis, infrequens.

Qualitas: herb. acris, foetida; radic. semin. —

Vis: narcotica, velicatoria.

Effectus: (*a baccis comestis*) Delirium et Mors. LINN. *Etiam externe* Vertigo, Delirium, Furor; *interne* Purgatio violenta.

G 5

155 A.

154. Radici vires *Hellebori nigri* LIETAVD adscribit. Unica barca vel illarum extractum (cuius tamen Grana duodecim puellae nil nocuere) gallinas aliasque aues occidere valet. SAVVAGES — Omnino haec classis multa nobis ignota continet toxica.

155. *A. racemosa*. *Dill. elth.* 79. *t.* 67. *f.* 78.
Pluk. alm. 54. *t.* 383. *f.* 3.

Locus: Americae borealis: Floridae, Virginiae, Canadae humida, vmbrosa.

Perennis, cicur.

Qualitas: radic. herb. et flor. graueolens.

Vis: Baccae nigrae praecipue multum venenatae dicuntur.

Effectus:

PODOPHYLLVM.

** *P. peltati* radix valde emetica est.

CHELIDONIVM.

156. *Ch. Glaucium*. *Flor, dan.* *t.* 585. *Knorr.*
del. 1. t. R. 19.

Locus: Angliae, Austriae, Heluetiae, Galliae, Italiae, Virginiae arenosa, lapidosa.

Annua, cicur.

Qualitas: crocei succi, quo tota planta scattet, foetida, amara, acris.

Vis: narcotica.

Effectus: Aliquot dierum Desipientia.

PAPAVER.

157. *P. somniferum*. *Blackw. t.* 482. 483. *Bul-liard herb. de France t.* 57.

P. bor-

157. Sub coelo calidiore e. g. in Apulia, Aegypto, Arabia, Persia vel euaporatio plantae homines humi prosternit stupefactos,

P. hortense semin. albo.

— *cristatum* flor et semin. albo.

— — — rubro et semin. nigro.

— *flore pleno*, albo.

Locus: Asia, Europae australioris ruderata et agri. *Annua, cicur.*

Qualitas: succi albi inspissati (opii) resinoso-gummosa, amara, acris, calidiuscula, foetida, inflammabilis.

Vis: narcotica, stimulans, exhilarans, phantastica, dementans, hypnotica, sistens, paragonica, paralytica.

Effectus: Animi Alacritas, Fibrae muscularis Intentio, tunc Relaxatio; inde ab una parte Hilaritas, Garrulitas, Exsultatio, Pulsus plenus, frequens, Insipientia, Salacitas, Orga-

factos, insensibiles, quibus liuor, tremor, tabes adcedunt. — Fermentatione partes opii volatiles a resinosis et gummosis, quae stimulantes sunt, magis separantur et liberiores redduntur, inde et vis illius valde augetur. Opium vulnere, vena, tela cellulosa citius, quam ore vel enemate adplicatum in corpus animale faeuit. Oleum seminibus expressum innocuum est; non ita, quae oleo expresso restat placenta, aut semina ipsa, quae licet a multis hominibus sine sensibili noxa adsumantur, tamen stupiditatem qualemcunque subinde inducere, obseruasse non nullis visum est. Saltem homines, recentia semina colligentes, sopore, et gallinae, deglutitis seminibus, lassitudine, vertigine, stupore et sopore corripiuntur, id quod experiri quilibet facile potest. Ceterum verosimillimum est, semina antiquiora, parte volatili orbata, minus vel plane non noxia esse; nociua autem recentia, multoque magis immatura, lacte adhuc repleta. — Absque dubio *Papauer Rhoëas, orientale* (cuius radix et capsulae immaturae succum fordide albescens, amarum, acrem continent) aliaque in primis calidiore climate culta opium, vilius quidem exhibent.

Orgasmus, Dyspnoea, Anxietas, Sudor, Inflammatio, Delirium, Furor, Sanguinis Resolutio putrida, Liuor, Vertigo, Apoplexia; *ab altera* Languor, Moeror, Se-et Excretiones impeditae, Somnus tranquillus, iucundus, aut Sopor Phantasiis horrendis turbatus, Sensuum Abolitio, Amaurosis cet. Lipothymia, Paralyfis, Mors, saepe tranquilla. Interdum critica diarrhoea, sudore copioso, foetido cum cutis pruritu aegrotos opio temeratos morti ereptos esse, obseruatum est. Opio tosto nouae quasi vires ex aëre adcedunt, ex quibus pristinam, dolosiores recuperat malignitatem.

ARGEMONE.

** A. mexicanae femina in Mexico vt fortius purgans adhiberi, HERNANDEZ refert; alii vires anodinas et soporiferas plantae adscribunt.

CAMBODIA.

158. C. Gutta. *Blackw. t. 392. Rheed. mal. 1. 41. t. 24.*

Locus: Malabaria, Zeylona, China.

Arbor, peregrina.

Qualitas: succi inspissati resinoso-gummosa, croceo-lutea, nitida, inodora, insipida, tandem acris.

Vis: draffica, hydragoga, emetica.

Effectus:

Effectus: Hyperemesis, Hypercatharsis, Intestinorum Inflammatio, Lipothymia, Mors subita, lenta.

MYRISTICA.

159. *M. fatua*. *C. Bauh.* p. 407. *Nux myristica mas.* *Clus. exot.* p. 14. *Houttuyn. Pfl. syst.* 2. 224. *e belg. in germ. transl.*

Locus: Bandae, Amboinae sylvae et montes.
Arbor, peregrina.

Qualitas: fructus insipida.

Vis: narcotica.

Effectus: Tres nuces tostae, RUMPHIO narrante, feminae purgandi scopo datae Desipientiam et Delirium intulerunt. — Feminae Iauanenses philtrum viris inde parant.

CALOPHYLLUM.

160. *C. Inophyllum?* *Rheed. mal.* 4. 81. t. 39.

Locus: Malabariae arenosa. *Arbor.*

Qualitas: succi, quem cortex laesus fundit, flavescentis et sole in gummi, *Gutta Gamba* incolis dictum, coagulantis mucilaginosum.

Vis: *Guttae* vid. n. 158.

Effectus:

LECYTHIS.

161. *L. minor.* *Iacq. amer.* 168. t. 109.

Loc.

Locus: Americae calidae, Carthagenae syl-
vae. *Arbor*.

Qualitas: venenata?

Vis:

Effectus: Vnicum semen integrum adsumsi,
quod sapore gratissimo praeditum depre-
hendi; sed post mediam horam nausea,
Anxietate magna, Capitisque Titubatione
praeter consuetudinem fui vexatus; an ab
hoc nucleo? *Iacq. l. c. p. 169.*

DOLIOCARPVS.

162. D. volubilis. *Rolander in Abhandlung der
schwed. Acad. d. Wissensch. B. 18. t. 9. f. 1.*

Locus: Surinami tumuli pratorum arenosi.

Qualitas: florum aromatica, nauseosa; bac-
car. rubrar. dulciaria, grata.

Vis: calida, vaporosa.

Effectus: Pruritus et Ardor Faucium atque
Oesophagi, Nausea, Vomitus, Febris, Fu-
ror, Tumor, Mors.

163. D. strictus. *Rolander in Abhandl. d. schwed.
Acad. d. Wiss. l. c. f. 2.*

Locus: Surinami colles argillacei in sylvis hu-
milioribus. *Frutex*.

Qualitas: baccar.

Vis: antecedentis.

Effectus: — —

TRIGYNIA.

P A E O N I A.

** P. officinalem, venenorum numerum institutis obseruationibus, virulentam illius indolem in apricum proferentibus, demum ingressuram, nunc solum subuenenatam dixerim; siquidem radicis odor grauis, narcoticus, illi florum congruens, et fugax istius acrimonia florumque sapor narcoticus, amaricans, et feminum vis emetica et cathartica id maxime suadent.

THEA.

164. Th. Bohea. *Geschichte des Thees und Kaffees aus dem Engl. des I. C. LETTON und I. ELLIS vibersetzt cet. mit Kupfern. Leipzig, 1776.*

β. Th. viridis.

Locus: Chinae, Iaponiae, Siram? Turequin? praecipitia, valles et ripae apricae.

Arbuscula vel arbor, peregrina.

Qualitas: (florum acris; capsul. lignae aromatica, ingrata; semin. oleosa; cortic. amara); folior. maxime recentium et aëre exsicca-

164. *Theae* volatile principium (hoc enim abeunte adstringens solummodo est) similes cum opio, licet debiliores edit effectus. — Tussis et haemorrhagiae, hic recensitae, adidebant in hypocausto puluere *Theae* subtili circumuolitante repleto se se tententibus illamque vario modo tractantibus. — Sineses Infuso *Theae viridis*, utpote *Bohea* damnosioris, abutentes diabete consumuntur.

exficcatorum suaueolens, amara, herbaeo-styptica.

Vis: narcotica, relaxans, diuretica; Infusi recentiori folio parati calideque adsumti anodina, somnum dissipans, subantiseptica, adstringens.

Effectus: cum Infusi, tum Euaporationis: Nausea, Spasmus, Cardialgia, Vertigo, Mentis Exhilaratio, Cephalalgia, Angor, Agrypnia, Imbecillitas, Tremor, Pulillanimitas, Melancholia, Insensibilitas, Aphonia, Memoriae Lapsus, Paralyfis, Haemoptoe, Tussis in Phthisin abiens, Diabetes, Mors lenta.

DELPHINIVM *).

165. D. Staphisagria. *Blackw. t. 265.*

Locus: Candiae, Istriae, Dalmatiae, Calabriae, Apuliae, Cretae, Galloprovinciae, Langedociae lapidosa.

Annua vel biennis, mansueta.

Qualitas: femin. foetida, amara, nauseosa, acris, inhaerens.

Vis: calida, drastica, anthelminthica, phthiriaca, vaporosa.

Effectus: Nausea, Alui Fluxus cum Suffocationis metu, Tremor, Sensuum Abolitio, Inflammatio, Conuulsio, Paralyfis, Mors.

ACONI-

*) *Delphinii* genus suspectum. *D. elatum* boues in Anglia necare Cl. MILLERVS narrat; attamen flores ab apibus visitantur.

ACONITVM *).

166. *A. Lycoctonum*. *Tournef. inst. t. 240.*
Besl. eyf. aest. 25. f. 2. Blackw. t. 563. Gmel.
sib. 4. 188. t. 81. Iacq. austr. t. 380. Bulliard
herb. de France t. 63.

Locus: Alpes Lapponiae, Heluetiae, Austriae,
 Italiae, Germaniae. *Perennis, cicur.*

Qualitas: totius plant. potissimum radic.
 acris; *Napello* debilior.

Vis: subnarcotica, phthiriaca.

Effectus: Dolor ardens, Vertigo, Mors. To-
 xicum sagittarium.

167. *A. Napellus*. *Act. Stoch. 1739. 41. t. 2.*
Blackw. t. 561. Knorr. del. t. E. Iacq. austr.
t. 381. Zorn. ic. t. 49. Garid. aix. 7. t. 2.
Bulliard herb. de France t. 45.

Locus: Heluetiae, Bauariae, Galliae, Germa-
 niae, montosa, humidiuscula; vt et borea-
 lis Asiae et Americae. *Perennis, cicur.*

Quali-

*) *Aconita* potissimum acria sunt, parum narcotica. Prae-
 cipuas species tantum retuli; eiusdem efficaciae sunt:
A. pyrenaicum, *A. Anthora*, *A. variegatum*, *A. vncina-*
rum, et procul dubio *A. Lycoctoni* varietas — vel
 species singularis — flore caeruleo (*Fl. dan. t. 123.*)
 in Heluetiae alpibus habitans. Etiam alia adhuc *varie-*
tas inuenitur flore pallide - rubro. *A. Lycoctoni*
 radix necat lupos, canes, feles; et decoctum aquosum
 mures, muscas, cimices et pediculos equorum atque pe-
 corum extirpat.

167. Cultura, exsiccatione, aetate proeclioire expulsisque
 partibus volatiliioribus eius virulentia infringitur. Etiam
 pollen prauae stirpis naribus adtractum nociuas exserit vires.
 — Errant, qui huius effectus *Aconito Cammaro* adscri-
 bunt.

Qualitas: herbacea, substyptica, nauseosa, *Aconitorum* acerrima, praecipue radicis.

Vis: corrodens, vesicans, vomitoria, drastica, conuulsiva, vertiginosa, sternutatoria, pellens, sudorifera.

Effectus: Dolor pungens, Ptyalisinus, Erosio, Exulceratio, liuidus Tumor, Vomitus, Cardialgia, Diarrhoea, Tormina, Tumor Abdominis, Ardor Encephali, Dolor formicans totius corporis atque Frigus, Dolor multarum partium arthriticus, vagus, Ophthalmia, Scotomia transitoria, Paralysis, Adfectus soporosi, Prostratio Virium, Deficientia, Delirium, furiosum, Spasmi, Anxietas, Lipothymiae, Pulsus Turbatio, Livor, Sudor frigidus, Mors ocyus seriusque. Eadem succus vulnere adplicatus profert symptomata. — Vel florum odor non nullis Lipothymiam et Visus Abolitionem duo et tres dies durantem inducit.

168. *A. pyrenaicum*.

Locus: Tartaria, Sibiria et Pyrenaeae alpes.
Perennis.

Qualitas:

Vis:

Effectus:

169. *A. Cammarum*. *Riu. t. 129. Iacq. austr. t. 424.*

Locus: Stiriae, Taureri, Austriae, Italiae, Bohemiae montes vmbrosi. *Perennis, cicur.*
Quali-

Qualitas: *Napelli*, sed eo debilior.

Vis:

Effectus:

POLYGYNIA.

CIMICIFUGA.

- ** C. foetida vi sua emetica et cathartica foetoreque stupefaciente veneni suspicionem subit.

AQVILEGIA.

- ** A. vulgaris semina, quae ad variolas expellendas, icterum sanandum et puero-
rum scabiem adhibentur, infantes necasse, ob-
servauit LINNE.

NIGELLA.

- ** N. quaedam e. g. *damaescena*, *satiua*, *ar-
uens* subuenenatae videntur; inprimis se-
mina illarum maiori dosi deglutita.

ANNONA.

170. A. muricata. *Iacq. obs. i. io. t. 5. Merian:
sur. t. 14. Pluk. alm. 31. t. 134. f. 2. et 32. t.
135. f. 2. Sloan. hist. iam. 2. 106. t. 225. Comm.
hort. i. 133. t. 69. Plum. gen. 43. t. 143. f. 1.*
Locus: America calidior, Surinamum.

Arbor.

Qualitas: flor. graueolens.

Vis:

Effectus: a flore deglutito lethalis; fruct.
Colica Passio.

ANEMONE.

171. *A. Pulsatilla*. *Fl. dan.* t. 153. *Ludw. ed.* t. 119. *Kniph. cent.* t. 4. *Knorr. del.* 2. t. A. 7. *Helw. puls.* 62 t. 8. *Zorn.* t. 76. *Bulliard herb. de France* t. 49.

Locus: Europae borealis campi, syluestres, exaridi collesque aprici.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: fol. caul. et flor. acris; rad. subacris, dulciaria.

Vis: corrodens, rubefaciens, vesicans.

Effectus: Dolor ardens, pungens; Vomitus, phthisis? Herbam floresque oves et caprae carpunt.

172. *A. pratensis*. *Fl. dan.* t. 611. *Helw. puls.* 65. t. 11. et 66. t. 12. *Stoerk. de usu puls. nigr. cum icone.*

Locus: Scaniae, Germaniae campi pratenses, aprici, aridi.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: folior. caul. et flor. vix odora, acerrima, inhaerens, vesicans tota.

Vis: resoluens, saliuans, alexipharmaca; masticat. linguam et fauces rodens.

Effectus: Emesis. — —

173. *A. palmata*. *Morif. hist.* 2. 425. f. 4. t. 25. f. 3.

Locus: Lusitania ad Tragum. *Perennis.*

Qualitas: praecedentis; rad. simul nauseosa.

Vis:

Effectus: — — (acris radicis) Dolor et Constrictio Pharyngis.

174. *A. sylvestris.* *Bulliard herb. de France.*

t. 59.

Locus: Germaniae, Helvetiae, Palatinatus, Sueciae, Sibiriae montes, ficciores, lapidosi, collesque. *Perennis, infrequens.*

Qualitas: et

Vis: sequentis.

Effectus: — — *A* bobus intacta relinquitur, et eam si tuburcinantur, Dysenteria et Haematuria contracta contabescunt.

175. *A. nemorosa.* *Fl. dan. t. 549. Bulliard herb. de France t. 2.*

Locus: Europae nemora, aspera, dura prataque verna. *Perennis, frequens.*

Qualitas: inodora, amaricans, acris, praecipue radicis.

Vis: corrodens, vesicans, calida.

Effectus: Vomitus, Dysenteria, Anxietas, Mors. — Et hanc *Anem.* depascentes oves et pecora Haematuria, Dysenteria et intestinorum Inflammatione adficiuntur.

176. *A. ranunculoides.* *Fl. dan. t. 140. Kniph. cent. 1. t. 5.*

Locus: Europae borealis nemora et confinia prata. *Perennis frequens.*

Qualitas: praecedente ardentior; petiolor. acerrima; multo magis radicis.

H 3

Vis:

175. Externe applicatur ad pedum clauos erodendos, sed nocet.

176. Quamvis forte plures species venenatae sint; tamen dubitavi hisce *A. narcissifloram* et *fasciculatam* addere.

Vis:

Effectus: — — Toxicum sagittarium ipsis
immanibus cetis lethale.

CLEMATIS,

177. *C. Vitalba.* Bulliard herb. de France t. 89.
Besl hort eyft. aest. ord. 6. t. 5. f. 2. Sabb.
hort. rom. 4. t. 40.

Locus: Virginiae, Iamaicae, Italiae, Hispaniae,
Galliae, Germaniae sepes sylvarumque fru-
tices.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: tot. plant. recent. ardens; flor. si-
mul suaueolens.

Vis: Excorians, vesicans.

Effectus: Inflammatio, Alui Fluxus cet.

178. *C. Flammula.* Knorr. del. 1. t. l. 9. Lob. ic.
stirp. 1. f. 1. Sabb. l. c. t. 41.

Locus: Italiae, Galloprovinciae, Monspeli,
lenae, Rhaetiae sepes. *Perennis, cicur.*

Qualitas: antecedenti acrior. digitis trita acer-
rimo odore nares ferit illis admota.

Vis:

Effectus:

179. *C. erecta.* Iacq. austr. t. 291. Stoerk. libell.
de Flamm. Iouis t. 1. Zannich. venet. t. 159.

Locus: Hungariae, Austriae, Pannoniae, Ta-
tariae, Monspeli, Heluetiae colles steriles,
aprici. *Radix perennis, cicur.*

Quali-

179. *C. Flammula et erecta* aqua elicitur spiritus adusti
instar feruida.

Qualitas: fol. flor. in primis recentium, praecedentibus acrior; herb. ficc. herbacea, acriuscula, diu inhaerens.

Vis: diuretica, sudorifera, laxans, vesicans. Folia recentia masticata fauces linguamue rodunt, diutius in ore retenta fauces subinflammant.

Effectus:

180. *C. integrifolia*. *Iacq. austr. t. 363. Sabb. l. c. t. 42.*

Locus: Tartaria, Hungaria, Austria, Sibiria. *Perennis, cicur.*

Qualitas: fere antecedentis.

Vis:

Effectus: — — *Equis* Dysenteriam excitat saepissime lethalem.

ADONIS.

** *Adonidis vernalis vires dubiae sunt, sed A. capensis tota septicae acredinis est.*

RANUNCVLVS. *)

181. *R. Flammula*. *Fl. dan. t. 5. Bulliard herb. de France t. 15.*

H 4

Loc.

180. Nec reliquarum species aliquot hac acredine excipiendae videntur.

*) Omnes *Ranunculi* acredinem, iuniores et in humidis crescentes damnosiores alunt, ope destillationis aquae admiscendam, et exsiccatione, aut alia praeparatione expellendam, mitigandam aut plane domandam. Quorum praecipuas species, de quibus observationes et experimenta constant, hic exposui.

Locus: Totius Europae pascua vda.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: herb. maximè iunioris, magisque feminis acris.

Vis: vesicans, exulcerans.

Effectus: — — Ouibz intestinorum Inflammationem et Hydropem adfert mortiferam; equorum hepar corrumpit, utpote in quo vesiculae aqua repletae suboriuntur.

182. R. reptans. *Fl. lapp.* 236. t. 3. f. 5. *Amm. ruth.* 80. t. 13. f. 1. *Fl. dan. fasc.* 2. t. 108.

Locus: Suecia, Lapponia, Russia, Heluetia, Germania ad ripas lacuum, aquas stagnantes et in pratis humidis.

Qualitas: } Habitu praecedenti tam adfinis,
Vis: } ut a non nullis varietas illius
Effectus: } habeatur, etiam vires easdem possidere videtur.

183. R. Lingua. *Fl. dan.* t. 754.

Locus: Europae borealioris fossae, aquae, limosa. *Perennis, minus frequens.*

Qualitas: folior. et semin. *Flammula acrior.*

Vis: caustica.

Effectus:

184. R. gramineus. *Bulliard herb. de France.* t. 123.

Locus: Montes Pyrenaei, Galliae prata nuda; *Perennis, varior.*

Qualitas: rad. praecipue florum praecedentium.

Vis:

Vis:

Effectus:

185. *R. Ficaria*. *Fl. dan. t. 499. Ludw. ed. t. 51.*
Blackw. t. 15. Zorn. ic. t. 66. Bulliard herb.
de France t. 43.

Locus: Europae umbrosa, spongiosa, culta.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: rad. austera, aescens, tunc amari-
 cans, nauseosa et ante florem maxime
 acris, alias ceteris mitior. Aqua stillatitia
 primaria est feruidissima, *Sinapeos* sapore.

Vis:

Effectus:

186. *R. Thoa*. *Iacq. Vind. 249. obs. 1. 25. t. 13.*
Iacq. austr. t. 442.

Locus: Helvetiae, Austriae, Galliae, Italiae
 er Pyrenaeae alpes. *Perennis.*

Qualitas: tot. plant. *R. scelerato* virulentior;
 radic. tamen vix sapida.

Vis:

Effectus: Insuperabilis Torpor cet. — To-
 xicum sagittarium.

187. *R. abortivus.*

Locus: Virginia, Canada.

Qualitas: acerrima.

Vis: draastica, emetica.

Effectus:

H 5

188. *R.*

185. *Vfus cibarius* cautior esse debebat. — Terra pin-
 gui crescens mitior deprehenditur.

188. *R. sceleratus*. *Gmel. fib. 4. 203. t. 83. f. a.*
Fl. dan. t. 571. Blackw. t. 259. Bulliard herb.
de France t. 47.

Locus: Totius Europae fossae et paludes.

Annua, infrequens.

Qualitas: tot. plant. inprimis iunioris acerri-
 ma; maxime floris vel potius germinis
 illius.

Vis: reliquorum — saluam mouens.

Effectus: Pruritus, Dolor ardens, Inflamma-
 tio, Excoriatio, Ulcera; *interne* Dolores
 arthritici, Angina, Ptyalismus, Cardialgia,
 Anxietas, Ventriculi Languor et Inertia,
 Singultus, Tormina, Lipothymiae, Spasmi
 oculorum, faciei, abdominis et artuum,
 Sudor frigidus, saepe Mors.

** Et *R. platanifolius* acris est; nec

** *R. asiaticus* semper sine acredine.

189. *R. illyricus*. *Iacq. austr. t. 222. Hort. Aichst.*
pl. vern. fol. 13. f. 1.

Locus: Italiae, Narbonae, Languedociae, Hun-
 gariae, Sclauoniae, Oelandiae, Austriae
 agri.

Perennis.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

190. *R.*

188. Siccatus pecoribus innocuus est, sed recens illis, in-
 primis ouibus morbum istum, *kalttes Feuer* quem dicunt, in-
 fert, plerumque lethalem.

190. *R. alpestris*. *Iacq. austr. t. 110. Segu. ver. 1. 489. t. 12. f. 1.*

Locus: Alpes Galliae, Austriae, Helvetiae.
Perennis.

Qualitas: reliquorum.

Vis: draistica, vesicans — —

Effectus:

191. *R. bulbosus*. *Fl. dan. t. 551. Bulliard herb. de France t. 27.*

Locus: Europae totius prata, pascua.

Perennis, vulgaris.

Qualitas: *R. scelerati*.

Vis:

Effectus:

192. *R. polyanthemos*. *Lob. ic. 666.*

Locus: Europae borealis graminosa et sylvae.

Perennis.

Qualitas: sequenti mitior.

Vis: vesicans.

Effectus:

193. *R. acris*. *Knorr. del. 1. t. H. 1. 2. Crantz. austr. 114. n. 10. t. 4. f. 2. Bulliard herb. de France t. 109.*

Locus: Europae prata, pascua.

Perennis, frequens.

Qualitas: fere illa *R. scelerati*, praecipue germinum.

Vis:

Effectus: (*Temporibus impositus*) immanis Ar-
dor, Animi Deliquia, Artuum (quibus et
externe

externe adplicatus) Immobilitas, Vlcera pertinacia.

194. *R. aruenfis. Fl. dan. t. 219. Bulliard herb. de France* 1. 116.

Locus: Europae australioris agri humidiores.
Annua, vulgaris.

Qualitas: praecedentis, radice et potissimum femine, quorum acritas, cito euanescens, innoxia est, exceptis; sed germin! —

Vis: caustica, vesicans.

Effectus: Tumor labiorum, linguae et interni oris, Dolor immensus et stupor Dentium ingratus; sed sero effectus edit. Canem paruum succi herba expressi Vncia vna ori infusa occidit.

195. *R. muricatus. Alpin. exot. 263. t. 262.*

Locus: Europae australis, Belgiae fossae et humentia.
Annua, cicut.

Qualitas: *R. scelerati.*

Vis:

Effectus:

TROLLIUS.

** *T. europaeus*, qui plurimis brutis pabulo est, acredinem fouet, et radix prauos edidisse effectus accusatur. *T. asiaticus* in Sibiria, *Aconiti* et *Delphinii elati* instar, heroicum habetur pharmacon, obstinacibusque opponitur morbis.

** *Ranunculus hederaceus* etiam acris est.

196. R. aquatilis. β . Pluk. alm. 311. t. 52. f. 2.
 γ . Col. ecpbr. 1. 315. t. 316. δ . Fl. dan. t. 376.
 Locus: Europae aquae vndosae, fossae, riuuli.

Perennis, frequens.

Qualitas: reliquorum, inprimis pl. tenerior.
 aut flor. recent. — Acrimonia huius et
 praecedentium ratione loci natalis notabi-
 liter variat.

Vis: vesicans.

Effectus:

HELLEBORVS.

** Helleb. hyemalis suspectus est, radix enim
 ad *H. nigri* qualitates adcedere dicitur.

** Helleb. viridis, cuius radix — monente Ill.
 SCHREBERO (*Linn. mat. med. edit. IV. p.*
163) — *H. nigro* amarior, acrior magisque
 nauseosa est, etiam viribus superior esse vi-
 detur.

197. *H. niger*. Schmidel. ic. pl. et analys. part.
 Iacq. austr t. 201 Blackw. t. 505-508. Knorr.
 del. 1. t. N. 6. Hill. anat. t. 1. Bulliard herb.
 de France t. 33.

Locus: Asia minor, Apenninae, Pyrenaeae,
 Hetruriae, Austriae alpes asperae.

Perennis, mansueta.

Qual.

197. Radix *H. nigri* in Helvetiae montibus habitantis, vel
 in Oriente culti validior est illa in Gallia cet. crescentis,
 GEOFFROI et TOURNEFORTO testibus.

Qualitas: rad. potissimum corticis et fibrillarum, reiecta radicis medulla, acris, amaricans, subnauseosa, inhaerens, foetida; ficcatae blandior.

Vis: purgans, pellens, vesicans. Odor ptarmicus.

Effectus: Diarrhoea, Vomitus, Enteritis, violenta Sternutatio, Stupor, Arthritis, Mors. Radix recens masticata linguam obstupefacit acredine. — Toxicum sagittarium.

198. *H. foetidus*. *Blackw. t. 57. β. Moris. hist. 3. 460. f. 12. t. 4. f. 7. Bulliard herb. de France t. 71.*

Locus: Europae australis, Angliae, Germaniae, Helvetiae, Palatinatus montes sylvestri, lapidosi. *Perennis, mansueta.*

Qualitas: rad. subinsipida; fol. acris, tetra; praecedente fortior?

Vis: purgans, emetica, anthelminthica.

Effectus: Hypercatharsis, Mors.

CALTHA.

** *C. palustris* pecoribus. bubulis, capris et omnibus gratissima (quod alii tamen negant referuntque *Caltham* pabulo admixtam; vehementem sudorem mouere, intestinorumque ulcera inducere) ob amaram ac ardentem acrimoniam in pharmaci suspensionem cadit; nec forte innocuus est usus cibarius cum radicis, tum floris adhuc inexplicati.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

ANGIOSPERMIA.

DIGITALIS.

199. *D. purpurea*. *Bulliard herb. de France* t. 21.
Fl. dan. t. 174. Blackw. t. 16. Riv. t. 104. β.
Knorr. del. 1. t. f. 9. 10.

Locus: Europa australior, Austria, Heluëtia.

Biennis, cicur.

Qualitas: capsular. seminal. semin. totiusque
 plantae amara, acris. Decoctum.

Vis: rodens, purgans.

Effectus: Nausea, vehementes Vomitus, Oesophagi Constrictio spastica, Singultus, Diarrhoea, interdum Ptyalismus, rarius Mors.

200. *D. lutea*. *Iacq. hort. t. 105. Sabb. hort. 2. t. 88. Moris. hist. 2. 479. f. 5. t. 8. f. 5. Riv. t. 105. Bulliard herb. de France t. 65.*

Locus: Galliae, Italiae, Heluëtiae sabulosa.

Perennis.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

BETONICA.

- ** *B. officinalis*. Foliorum odor narcotico-balsamicus, sapor nauseosus, calidus est; recentia narcotica dicuntur, ficcata ptarmica sunt; radix nauseosa emetica est; hypercatharsin excitasse dicitur. An?

PEDIC.

PEDICULARIS.

- ** *P. palustris*, ardenti acredine notata, qua capris quamvis esculenta, saepius tamen pecoribus buceris lethalem mictum cruentum infert, venenis inferenda videtur.

ANTIRRHINUM.

- ** *A. Cymbalaria* quoddam pharmacon, *Poudre de succession*, quod dicunt, quondam ingressa fertur; anne reliquis ingredientibus virus potius tribuendum erat?
- ** *A. minus*, cuius herba est amara, nauseosa, quondam ad philtrea paranda adhibebatur.
- ** *A. Orontium*, cuius folia acria et amara sunt, LINNEVS suspectum pronunciauit.

BIGNONIA.

- ** Variæ *Bignoniæ* species, imprimis *B. crucigera* et *radicans* venenatae habentur.
-

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILIQVOSA;

CLEOME.

201. Cl. gigantea. *Iacq. obs. 4. 1. t. 76.**Locus*: Guinea.*Frutex.**Qualitas*: (sapore) vrentissima, (odore) vi-
rosissima.*Vis*:*Effectus*:

** Tetradynamistarum maxime solo humido
vel tempestate eiusmodi crescentium pluri-
mis, sed recentibus et potissimum illarum se-
minibus, etiam ficcis, principium quoddam est
acre, volatile. e. g.

ERYSIMVM.

** E. officinale; folia maxime caulis superio-
ris acerrima sunt, vt cuti imposita vesicas in-
terdum eliciant, semina acriora sunt.

RAPHANI.

** R. Raphanistri folia et semina praecedenti
acriora sunt.

SINAPIS.

** S. nigra tusa vel Cochleariae Armora-
ciae maior dosis et vsus frequentior spasmos
oris, nasi, oculorum vt et totius corporis
excitat. *Sinapi* abutentes morosos et melan-
cholicos fieri dicunt.

I

CRAM-

CRAMBES.

** *Cr. maritimae* turiones, illis *Asparagi* similes, in *Spinachiae* modum parati eduntur; non autem plantae aetate prouectioris folia, tenacissima enim sunt et vertiginem creant.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

POLYANDRIA.

SIDA.

202. *S. asiatica*. *Rumph. amb. 4. 29. t. 10. Rheed. mal. 6. 2. t. 4. Pluk. phyt. 196. f. 5.*

Locus: Indiae aquosa: Iaua, Baleya.

Subfrutex.

Qualitas: feminis.

Vis: soporosa.

Effectus: feminis Vncia vna in Turcia adhibetur ad somnum conciliandum, ex quo non euigilant homines, nisi ipsorum nares aceto confricentur.

BARINGTONIA.

203. *B. speciosa*. *Suppl. pl. 313. Sonnerat. guin. t. 8. 9. Rumpf. amb. v. 3. 179. t. 114.*

Loc.

203 Consultum et commodum ducō, venena pisces obstupefacientia vel necantia, quae hodie innotuerunt nobis omnia, hic loci singulatim recensere, quae sunt:

- 1) *Verbascum Thapsus*, ab Italis *Barbasco* nominatum, qua voce omnia pisces in ebriantia insigniuntur; semen huic fini inseruit. — *V. thapsoides* (*Thapsi* varietas) et *V. phlomisoides* easdem possident vires.
- 2) *Iacquinia armillaris*, arbusculae in insularum Caribaearum: Curacao, Martinicae, Carthagenae cet. syluis et fruticetis a mari non ita longe remotis habitantis, folia et frondes in aquas iniiciuntur.
- 3) *Cerbera Abouai* vid. n. 62.

Locus: inter Tropicos plerumque ad littora Oceani, fluminum ostia in India orientali, ab oris australioribus Chinae per omnes insulas Moluccas vsque ad Taheiti, Marchionis et Mendozae insulas Maris Pacifici.

Arbor.

Qua-

- 4) *Daphne foetida* (Suppl. pl. 223.) in insulis Maris Pacifici, Taheiti. Forst.
- 5) *Paullinia pinnata*, in ins. Caribaeis habitans pisces necat. Plum.
- 6) *Sapindus Saponaria*. Id.
- 7) *Rhododendron dauricum*, Florum pistilla pisces inebriare dicuntur.
- 8) *Euphorbia Esula* (n. 144. not.) et *E. biberna*. n. 148.
- 9) *Affae indicae* (Houttuyn. Pfl. syst. 4. 41. t. 26. f. 1.) arboris vel fruticis ad oras insularum Amboinensium frequentis cortex, cuius odor fortis idem fere, qui piscibus est, tufus; cineribus mixtus et aquis iniectus pisces non inebriat modo, sed et necat.
- 10) *Lepidium Piscidium*. Forst.
- 11) *Robinia Nicou*. Aubl. guian. 772. In Guiana. Aubl.
- 12) *Piscidia Erythrina*, arbor in India occidentali, Iamaica et America australi habitans; cortex, inprimis radices, ramuli et folia tusa atque in aquam demersa pisces minores necat, maiores sensu et motu priuat, ita vt in superficie aquae resupini natent; exceptis Muraenis. Homini innocua est. — An et *Piscid. carthaginensis* pisces obstupefaciat?
- 13) *Phaseolus semierectus*. Semina venenata et pisces stupefacientia dicuntur.
- 14) *Cytisus?* fruticosus erectus villosus, fol. pinnatis, spicis terminalibus Brown. iam. 296. Surinam - poison. In Iamaica. Brown.
- 15) *Galega cinerea*. In Guiana.
— *literalis*. In Insulis Maris Pacifici Forst.

16) *Gre-*

Qualitas: nucleor. —

Vis: inebrians.

Effectus: — — Piscatores nucleos, quibus eadem, ac *Piscidiae*, *Galegae* et *Coculo* cet. vis est. escae admixtos, piscium stupefaciendorum causa in mare abiiciunt.

- 16) *Grewiae orientalis*, arboris, quam Bandae in hortis colunt, folia contusa, cineribus commista, per noctem in vase clauso seruata et dein manibus trita in aquas proiciuntur; inde pisces mortui in conspectum veniunt. Ceterum folia, nec hominibus, nec volucris nociva, oves et hirci depascuntur.
- 17) *Menispermum Cocculus*. Pisces a pulvere baccarum vertiginosi et attoniti fiunt, tandemque pereunt vid. n. 243.
- 18) *Baillera aspera*. Aubl. gu. 806. In Guiana. Aubl.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

DECANDRIA.

ABRVS.

204. A. precatorius. *Sloan, iam. 70. hist. 1. 180. t. 42. f. 4. 5. 6. Pluk. alm. 294. t. 214. f. 5. Rumph. amb. 5. 57. t. 32. Rheed. mal. 8. 71. t. 39. Alp. aegypt. 40. t. 40. Linn. Pfl. syst. 184. t. 27. f. 3.*

Locus: Indiae orientalis: Aegypti, et Americae calidae argillofa, lapidosa.

Frutex, mansuetus.

Qualitas: femin. rubra, alba et flaua. Herba dulcis innocens est.

Vis: draftica, emetica.

Effectus: Anxietas, Conuulfiones, Mors. Semina 3-4 mortifera funt.*) HERM.

SPARTIVM.

- **) Sp. purgans, acre drafticum et emeticum dicitur, vt et Sp. scoparium.

DOLICHOS.

- **) D. vngiculatus. Fructus, rite praeparati ferculum praebentes, crudi infalubres et pecoribus toxici funt.

- **) D. enfiformis, qui in laua infulisque vt reliquarum specierum multae efatur, femina BROWNE venenata dixit.

*) Semina ab Aegyptiis cocta edi ALPINVS adfirmat. An coctione innoxia reddantur? An erret Celeberr. Vir?

LATHYRVS.

** L. Cicera et Satius venenosis stirpibus iure adnumerari non possunt, quum panis ex illorum seminibus coctus, aliquod temporis spatium continuo adsumtus, nec sensorium commune, nec aliam corporis partem adficiens multoque minus mortem adferens, solum modo sequentia procreat symptomata: Genua quam maxime flectuntur et ad se invicem adcedunt cum maximo rigore; titubant aegroti pedibus extremis innixi, talis eleuatis incedentes femur, tibiam pedemque vna mouere coguntur, perinde ac si omnes dictae partes inter se concreuissent. Quae symptomata vt plurimum subito miseros corripunt, nullo praenunciante dolore; interdum tamen quaedam imbecillitas et molestus sensus circa genua praecurrunt. Feminae adultae fere ab hacce miseria liberae manent. Causa longe vero simillima omnino est materiae terrestres, qua semina ista multum sca- tent, quae illorum vsus humores refarcit, depositio inter genuum articulos, ossibusque ipsis adrescentis.

ERVVM.

** Er. Erulia. Panis ex huius seminum et tritici inuicem mixtorum farina coctus, BIN- NINGERO et VALLISNERO testibus, quibusdam hominibus pedum debilitatem induxit, ita vt absque fulcimento erecti pedi-

bus infistere nunquam poterant; quod et ipsis equis, totam plantam deuorantibus addidebat. Columbibus semina minus nocua dicuntur; gallinae vero intensa ingluuiei expansione pereunt.

CYTISVS.

** Cyt. Laburni folia magisque semina vehementius per inferiora purgant et superiora.

PHACA.

** Ph. baetica. Semina masticata linguae et oesophagi vehementem inflammationem incendere feruntur.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICVM.

205. *H. bacciferum*. *Suppl. pl. 344. Aubl. guian.*
784. t. 311.

Locus: Surinamum. *Frutex l. arbor.*

Qualitas: succi inspissat. quo tota planta sca-
tet, viscida, lutea.

Vis: Gumm. Guttæ.

Effectus: — —

205. Gallis loco *G. Guttæ* in usu est. — Plures *Hy-*
perici species huiusmodi laticem continent.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA AEQUALIS.

LACTVCA.

206. L. Scariola. *Morif. hist. 3. 58. f. 7. t. 2. f. 17. Barr. ic. 135. Herm. parad. t. 191.*

Locus: Europae australioris, Heluetiae, Germaniae aggeres, sepēs.

Annua, cicur.

Qualitas: sequentis. *Odor* minus virosus.

Vis: — —

Effectus: — —

207. L. virosa. *Morif. hist. 3. 58. f. 7. t. 2. f. 16.*

Locus: Europae australioris, Angliae, Argentorati aggeres, sepēs. *Biennis, cicur.*

Qualitas: herb. tetra, amaricans; lactis simul acris. Succus inspissatus inflammabilis est, Opii succedaneus, etiam odore Opium mentiens.

Vis: calida, anodina, hypnotica, antispasmodica.

Effectus: Opii, forte tamen ab eo oriundis debiliores — vel euaporatio Vertiginem excitat.

Carli-

207. Herbae incensae fumo animi causa naribus excepto D. LISTER se veluti consternatum et vertigine subita correptum et eodem plane modo adfectum sensit, quo solent, qui *Nicotianae* fumum haurire adgrediuntur.

CARLINA.

- ** C. acaulis radix vomitum et diarrhoeam interdum mouens, canes, porcos et mures trucidare dicitur.

ARTEMISIA.

- ** In castris quibusdam Moscauticis equorum, in regione magnam *Artemisiae Absinthii* copiam alente, pascentium multi periere.

ERIGERON.

- ** E. viscosum. Folia acria et narcotica capras interimunt; idemque *E. graueolens*. concernit.

DORONICVM.

- ** Dor. Pardalianches, quod Arnica montana longe superat efficacia, innocens est; nec C. GESNERVS hac planta, quae deglutita ingratam modo ventriculi sensationem, inflationem illius et corporis languorem Magno Viro excitauit, sed peste abreptus est. Saepissime herbam, cuius sapor et aromaticus et grate acris est, vt et radicem recentem et siccata[m] frequenter, palato suo quasi indulgens, sine v[er]o incommodo, deglutiuit.

EVPATORIVM.

208. *E. fastidiosum.* Rottboell. Act. Hafniens.

1778. 298.

Locus: Surinamum.

Qualitas:

Vis: venenata.

MONOGAMIA.

LOBELIA.

209. *L. Tupa.* Fewil. peruv. 2. 739. f. 29.

Locus: Peru.

Qualitas: herb. et rad. lactescens.

Vis: venenatissima.

Effectus: Floris odor solus Vomitus excitat horrendos; Caccitas a succo oculis inlato.

210. *L. longiflora.* Iacq. hort. t. 27. Sloan. iam. 58. t. 101. f. 2. Plum. spec. 3. ic. 253. f. 1.

Locus: America australior, India occidentalis: Iamaica ad ripas. *Annua, mansueta.*

Qualitas: lactescens, acris, linguae sensum ardoris inprimens; flor. adorifera.

Vis: irritans, inflammans, vesicans, venenatissima.

Effectus: Interne sumta Hypercatharsin creat nullis remediis cedentem, tandemque lethalem. Cadaueris intestina gangraenosa adparent. Succo eius infecta manus, si oculos fricat labiaque, inflammationem inducit vrentem. *Iacq. amer. 220. Quando*

do in hybernaculo stat, vbi aër non renouatur, atmosphæram effluuiis implet pulmonum et odoratus organo infestis, vt ibidem cum difficultate quis permaneat. *Iacq. hort. 1. 10.* Folia equis lethalia esse feruntur. *Iacq.*

211. *L. Cardinalis.* *Moris. hist. 2. 466. f. 5. t. 5. f. 54. Knorr. del. 2. t. L. 2. Hern. mex. 879. t. 880.*

Locus: Virginia.

Perennis, mansueta.

Qualitas: acris.

Vis: septica.

Effectus:

212. *L. vrens.* *Bulliard herb. de France t. 9. Moris. hist. 2. f. 5. t. 5. f. 56. Bocc. 20. t. 11.*

Locus: Gallia, Hispania, Italia, Germania.

Annua, cicur.

Qualitas: lactescens, acris, inprimis radicis.

Vis: caustica.

Effectus: Inflammatio oris Gangraena.

- ** *Lobeliae* plures deleterias species autumo. Etiam *L. syphiliticae* radicem in maiori dosi lethalem esse adfirmant.

VIOLA.

- ** *Viol.* quarumdam e. g. *paruiflorae* (radices habitu virtuteque *Ipecacuanbae* simillimas habentis *Suppl. pl. 396.*) *Ipecacuanbae, diandrae* vis emetica cet. cui non nullarum
odor

odor obstupefaciens adcedit, suspicionem mouet.

IMPATIENS.

** Imp. Nolitangere. Huius herba cuti imposita rubefaciens est; aquae destillatae maior dosis diabetem inducit. Non nulli herbam per vomitum et aluum purgare, immo perniciosam et deleteriam esse aiunt.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

POLYANDRIA.

SERAPIAS.

- ** S. latifolia. Herba viribus cum *Helleboro nigro* conuenire creditur.

ARISTOLOCHIA.

- ** A. Anguicida. Totius plantae odor ingratuſ, naufeofuſ eſt: radix amara, foetida, ſucco coloris aurantiaci repleta. Saliuae, maſticata radice viribus iſtius impraegnatae, gutta vnica vel aliquot ori ſerpentis, non tamen adeo magni, immiſſae illum ſtupidum et paralyticum reddunt, vt tuto poſſit manu comprehendere; aliquot horis tamen elapſis ad ſe redit; plures autem guttae ſubito ſerpentem in tremores et totius corporis conuulſiones coniiciunt et interimunt. Vel odorem plantae huius ſerpentes fugiunt. Homines guttas non nullas impune deglutiunt, ſed maior doſis, ipſo celeberrimo IACQVIN autumante, periculofa ne ſit, verendum eſt. — *Aristolochiae* plures ſpecies e. g. *A. rotunda*, *longa*, *Clematidis* cet. deleteria habentur.

PISTIA.

- ** P. Stratiotes. Haemorrhagias a potu aquae, in qua copioſe creſcit, praefertim menſibus ficcio-

ficcioribus, oriri (*Brown. iam. 330.*) legitur. Alii herbae vires adstringentes adscribunt, in patria sua interne et externe ad haemorrhagias sistendas adhiberi prodentes.

ARVM.

213. A. Dracunculus. *Sabb. hort. 2. t. 76. 77. Moris. hist. 3. f. 13. t. 5. Bulliard herb. de France t. 73. Weinmann. t. 472. 1. b.*

Locus: Europa australis. *Perennis.*

Qualitas: flor. foetida; succi, inprimis radic. acerrima.

Vis: septica, rubefaciens, vesicans.

Effectus:

214. A. Dracontium. *Blackw. t. 269. β. Pluk. alm. 52. t. 271. f. 2.*

Locus: Americae septentrionalis humida.

Perennis.

Qualitas: praecedentis.

Vis:

Effectus:

215. A. musciuorum. *Suppl. pl. 410.*

Locus: — — Hortus Vpsal.

Qualitas: flor. cadaueris instar foetida.

Vis: — — (*vid. Act. holm.*)

Effectus:

216. A.

213. Omnibus *Aris* acrimonia temporis progressu in aërem auolans seculamque inertem relinquens ineft.

216. *A. Colocasia*. *Catesb. car.* 2. t. 45. *Col. ecphr.*
2. t. 1. *Rumph. amb.* 5. 313. t. 109.

Locus: Cretae, Malthae, Candiae, Cypri, Syriae, Aegypti aquosa. *Perennis, peregrina.*

Qualitas: praecedentium.

Vis:

Effectus:

217. *A. esculentum*. *Sloan. hist.* 1. 167. t. 106. f. 1.
Rumph. amb. 5. 318. t. 110.

Locus: India occidentalis, America. *Perennis.*

Qualitas: reliquorum, folior. subdulcis, postea subacris.

Vis: — folior. diuretica, eccoprotica.

Effectus:

218. *A. trilobatum*. *Herm. par.* 79. t. 78. *Comm. hort.* 1. 97. t. 51. *Mill. dict.* t. 52. f. 2. *Rumph. amb.* 5. 320. t. 110. f. 2.

Locus: Zeylona.

Perennis.

Qualitas: tot. plantae feruida, mordax.

Vis:

Effectus:

219. *A. maculatum*. *Mill. dict.* 1. ic. t. 52. *Fl. dan.* t. 505. *Blackw. t.* 228. *Sabb. hort.* 2. t. 74. *Knorr. del.* 2. t. A. II. *Zorn. ic. t.* 75. *Bulliard herb. de France t.* 25.

Locus: Europae australioris, Heluetiae, Germaniae subhumida, umbrosa.

Perennis, cicur.

Quali-

217. *A. esculentum* a suis crudum sine noxa deuorari dicitur.

Qualitas: radic. prima vere vel post deflorescentiam effossae inodora, lactescens, amylacea, primum insipida, mox intense pungens, inhaerens, fol. et flor. acrior.

Vis: antecedentium; diuretica, resoluens cet.

Effectus: Vomitus cruentus, Cardialgia, lethalis.

220. *A. virginicum*.

Locus: Americae septentrionalis: Virginiae, Pensylvaniae humida. *Perennis*.

Qualitas: praecedentium. Etiam baccae valide vrent.

Vis:

Effectus:

221. *A. ouatum*. *Rumph. 5. 312. t. 108. Rheed. mal. 11. 45. t. 23.*

Locus: India: Amboina, Surinamum cet.

Qualitas: fol. foetidissima.

Vis: venenatissima, caustica.

Effectus: Primis labris degustatum Intumescientiam Maciemque, e qua raro contingit, conualescere, inducit. — —

222. *A. arborescens*. *Plum. amer. 44. t. 51. get. 60.*

Locus: America meridionalis.

Qualitas: reliquorum.

Vis:

Effectus:

220. Sues, huius radicibus, quas auide vbicunque effodiunt, valde delectantur.

221. Adultum a pecoribus intactum relinquitur; tenellum inter gramina delitescens gregem avidum nuperque claustris emissum morte plectit, si qua deuoratum est copia.

Effectus: — — Foliorum vel trunci frustulum, quod Nigritae pro poena ore tenere saepius coguntur, apice linguae degustatum vehementem excitat dolorem, tumorem atque ptyalissimum.

223. *A. seguinum*. *Iacq. amer.* 239. *t.* 151. *Mill. ic. t.* 295. *Plumer. amer.* 44. *t.* 60. 51. *b. fil.* 195. *b.*

Locus: Americae, Iamaicae humidiora.

Caulescens.

Qualitas: acerrima, teterrima.

Vis: corrodens, inflammans, venenata.

Effectus: Succus summis labris degustatus Mutitatem per aliquod tempus inducit, linguaeue supra modum inflammationem, teste SLOANE,

DRACONTIVM.

224. *D. foetidum*. *Catesb. car.* 2. *t.* 71.

Locus: Virginiae, Carolinae, Zeylonae, umbrosa, paludosa, aquosa. *Perennis.*

Qualitas: *Allii* instar foetidissima, aeris, mordacissima.

Vis: *Ari maculati.*

Effectus: Faucium Adstrictio. — Cephalalgia a solo odore.

224. Pecora folia non adtingunt; sed vrsi ex hybernaculis redeuntes vere in radicis esu acquiescunt.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

POLYANDRIA.

BVXVS.

- ** B. semperuirens. Foliorum, quae sunt nauseosa, amara, Drachma vnica purgat. — Cameli *Buxum* libenter pascuntur, sed subito pereunt, HANWAYO in itineribus suis per Persiam institutis obseruante.

IVGLANS.

- ** I. regia. Internus trunci cortex, et radices vehementer purgare et emesin excitare dicitur.

FAGVS.

225. F. syluatica. *Lob. ic. 2. 160.*

Locus: Europae syluae. *Arbor, vulgatissima.*

Qualitas: nucum oleosa, farinacea, adstringens.

Vis: nuc. potissimum virentium narcotica.

Effectus: Torpor, Tristitia, Imbecillitas, Cephalalgia, Febris acuta, Hydrophobia lethalis.

ADELPHIA.

CROTON.

- ** C. tiorium suspectum est; nam *Tornasolis caerulea* et *lacca caerulea*, quae ex eo con-

225. Vel ipsos suos initio harumce nucum esu turbulentos reddi et tandem obdormiscere adserunt.

conficiuntur occultam acredinem fouent eam-
que vehementem; masticata initio insipida,
sed post aliquot momenta, licet omnem sali-
vam curiose exspueris, ardor in faucibus sub-
oritur vehemens, continens, totumque col-
lum interdum occupans. Antiquiores chi-
rurgi lacca hacce vel succo ad verrucas vt se-
ptico utebantur.

226. C. Tiglium. *Burm. zeyl. 200. t. 90. Rumph.
amb. 4. 98. t. 42. Rheed. mal. 2. 61. t. 75.*

Locus: India orientalis: Zeylona.

Arbustula, peregrina.

Qualitas: radic. inprimis corticis illius, ligni
recent. foliorum (quae vt ceteris partibus
debiliora, delibata linguam vellicant et
adurunt) granor. nauseosa, acerrima.

Vis: emetica, draastica, exurens.

Effectus: Hyperemesis, Torsiones Ventris,
Hypercatharsis cruenta, Ani Excoriatio,
I 3 Hecti-

226. Aues semine *Tiglii*, in esca exposito, degustato illico
sopitae et stupidae decidunt, et auidius deglutito moriuntur;
nec minus pisces. Etiam folia cum fructu contusa et oleum
(cuius gutta vnica vel aliquot in vmbilici regione illinitae
purgant, et quo etiam Crocodili Caymanes interimuntur)
aucupiis et piscationi deseruiunt. Sed oleum, quia vis ferui-
da et draastica granorum cuticulae solum ineest, semine decor-
ticato pressum acre est; semina epidermide liberata amygdal-
arum dulcium loco esitantur. — Seminum et ligni vis
aetate frangitur. — Iure plura *Tricocca*, quo et *Tiglium*
pertinet, suspecta habentur.

Hectica mortalis, Inflammatio Intestino-
rum, Sitis vehementissima, Animi Deliquia,
Mors.

** Cr. lacciferum. Omnium partium odor
aromaticus est. Foliorum et radicis infusum
superne et inferne purgat.

227. C. aromaticum. *Rumph. amb. 3. 197. t. 126.*
Locus: Zeylonæ litora. *Arbuscula.*

Qualitas: folior. praesertim sole calefacto-
rum odor grauis, ingratus, ad vaccarum
urinam adcedens, acris. Laccam fundit.

Vis:

Effectus: Caput adgrauat.

IATROPHA.

** I. gossypifolia suspecta est. Attamen folia
in colica sicca interne et in clysteribus adhi-
bentur.

228. I. Curcas. *Iacq. hort. 3. t. 63.*

Locus: Surinamum, Brasilia, Iamaica.

Frutex vel arbor, fera.

Qualitas: adstringens, virosa; succ. turbide-
aquosa; sem. oleosa, subinsipida.

Vis: vrens, inflammatoria, drastica, emetica.

Effectus: Emesis, Profluuium Alui, Tormina,
Intestinorum Erosio et Inflammatio.

229. I.

228. Semen dimidium *ἄνω* et *κάτω* purgat. PRYON. in
BVRM. fl. ind. 306. Nuclei a tribus ad sex adsumti pur-
gant, plures vomitum mouent. IACQ. hort. 3. 136. Etiam
tres vel quatuor superne et inferne quadragesies purgasse re-
latum legi.

229. *I. multifida*. *Breyn. cent. 116. t. 53. Moris. hist. 3. 348. f. 10. t. 3. f. ult. Dill. elth. t. 173. f. 213.*

Locus: America meridionalis. *Frutex ferus.*

Qualitas: nuc. praecedentis; etiam folior. et petiolor. acris, amara; succi, quo omnes partes scatent, flauescens.

Vis:

Effectus: a folior. decocto Diarrhoea, Emesis.

230. *I. Manihot acris*. *Sloan. hist. 1. 130. t. 85. Pluk. alm. 241. t. 205. f. 1. Mer. surin. 4. f. 4. 5. Tournef. inst. 658. t. 438.*

Locus: America australis. *Arbuseula, fera.*

Qualitas: succi viscida, acerrima; praesertim radicis.

Vis: conuellens.

Effectus: Mors subita, Conuulsiones vehementes, Tumor Abdominis, subitus Languor.

RICINVS.

231. *R. communis*. *Ludw. ed. t. 7. Blackw. t. 148. f. 1. 2. Mill. ic. 219. Merian. surin. 30. t. 30. Canu. monogr. t. 1. Zorn. ic. t. 131.*

Locus: Temperatum coelum iv. orbis partium. *Annua, mansucta; biennis; perennis.*

K 3.

Quali-

230. *Manio* (quae vera denominatio est, non *Manihot*) acris, *latrophae Manihot dulcis* varietas, rite praeparata eadem, ut *M. dulcis*, innocuo Americanis alimento est. Succus (etiam aliis animalibus: auiibus, porcis, ouibus cet. quoque externe applicatus deleterius, quibus tamen hoc toxico enectis impune vescuntur) fermentatione eneruatur.

Qualitas: succi acris, amara; cotyledon. subadstringens, oleosa.

Vis: draftica, inflammatoria; folior. purgans; olei exprefsi laxans, anthelminthica.

Effectus: Alui Fluxus, Vomitus, Inflammatio Inteftinorum, Gangraena,

HIPPOMANE.

232. H. Mancinella. *Iacq. amer. t. 159. Catesb. car. 1. t. 95. Sloan. iam. 129. hist. 2. 3. t. 159. Comm. hort. 1. 131. t. 68. Pluk. phyt. 142. f. 4.*

Locus: Insulae Caribaeae, et continens Americae calidae ad mare. *Arbor, peregrina.*

Qualitas: totius arbor. potissimum cortic. et pulpaе fruct. lactescens, acerrima; fruct. viscida, grate acescens, tunc acris.

Vis: caustica, exurens, vesicans; lintea corrodens.

Effectus: *externae* Pruritus, Erosio, Inflammatio, Gangraena, Coecitas temporanea vel permanens; *internae* Calor vrens in ore, oesophago, ventriculo, cum Tumore inflammatorio, Sudor frigidus, Animi Deliquium, Mors. Succus crudus olim toxicum sagittar. praebuit.

233. H.

232. An drupa edatur a cancro *Ruricola L.* inde venenato? — Lintea succo maculata, lotione foraminata adparent. — Attamen femina grauida huiusmodi fructum sine noxa deglutiuit; et alia tres. An vera?

233. *H. biglandulosa*. *Iacq. amer.* 249. t. 158.
Plum. gen. 50. ic. 171. f. 2. *Pluk. alm.* 369. t.
 229. f. 8. *Linn. Pfl. Syst.* 2. 390. t. 16.

Locus: America calidior: Carthagenae syl-
 vae, sepes, insulae, Barbados. *Arbor.*

Qualitas: omnium partium lactescens, visci-
 da, vrens.

Vis: venenata.

234. *H. dioica*. *Rottboell. Act. Hafniens.* 1778.
 301.

Locus: Surinamum. *Arbor.*

Qualitas: lurida, lactescens.

Vis: venenatissima,

Effectus:

HVRA.

235. *H. crepitans*. *Hort. cliff.* 486. t. 34. *Comm.*
hort. 2. 131. t. 66. *Trew. ebret.* 34. 35. f. 1.

Locus: Mexico, Guayana, Iamaica.

Arbor, fera.

Qualitas: lactis fauciatis ramis defluentis
 acerrima, calorem in ore excitans. *Brown.*
 352.

Vis: drastica, emetica.

Effectus: Nuces 1 - 2 servis Nigritis scopo
 purgandi datae pene lethales fuerunt.
 AVBL. — Succus in oculos illapsus excoe-
 cat post octiduum.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

236. *M. Elaterium.* *Sabb. hort. 1. t. 64. Blackw. t. 108. Dod. pempt. 663. f. 2. Bulliard herb. de France t. 81.*

Locus: Europa australis: Italia, Narbona, Sicilia. *Annua, subcicur; perennis.*

Qualitas: rad. succ. amarissima, nauseosa.

Vis: emetica, draastica, pellens, abortiua.

Effectus: Periculosissimae Euacuationes cet.

CVCVMIS.

237. *C. Colocynthis.* *Blackw. t. 441. Sabb. hort. 1. t. 70.*

Locus: Syria, Alepo.

Annua, perennis, mansueta.

Qualitas: pulpae fructuum amarissima, nauseosa, acriuscula (odor debilis, ingratus); femin. amygdalina, dulcescens, pinguiuscula.

Vis: draastica, emmenagoga, abortiua, anthelminthica.

Effectus: Hypercatharsis saepe cruenta, Hyperemesis, Tormina, intestinorum Inflammatio, Exulceratio, Mors.

238. *C. prophetarum.* *Iacq. hort. 1. t. 9. Blackw. t. 589.*

Locus: Arabia.

Annua, cicur.

Qual.

Qualitas: amara cet. fere *Colocynthis*.

Vis:

Effectus:

- ** *C. maderaspatani* fructus, ad oram Coromandel crescentis, qualitate *Colocynthis* convenire; alii vero saporis grati, ad fructus *Perisicae* adcedentis, esse dicunt.

BRYONIA.

239. *B. alba*. *Blackw.* t. 533. a. b. *Knorr.* del. 1. t. Z. 2. *Fl. dan.* t. 813. β. *B. dioica*. *Iacq. austr.* t. 199. *Blackw.* t. 37. *Mill.* ic. 71 *Sabb. hort.* 1. t. 58. *Bulliard herb. de France* t. 55.

Locus: Europae pagi et sepes.

Perennis, infrequens.

β. — — — *varior.*

Qualitas: rad. recent. turion. acris, amara, nauseosa, substyptica, lactescens; baccar. mitior. *Fecula* iners.

Vis: purgans, pellens, resoluens, anthelmintica, subnarcotica.

— β. fortior esse videtur.

Effectus: Vomitus, Hypercatharsis, Insania, Stupor, Scotomia, Anxietas, Vertigo, forte et Mors.

K 5

DIO-

239. *Bryoniae* omnes eiusdem indolis sunt.

DIOSCOREA.

** D. triphyla. Radicis succus acerrimus cutem vehementi adficit pruritu, saepe cum subsequente epidermidis desquamatione. Interne non mortem quidem, tamen anxietatem et vertiginem intulit.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

TRIANDRIA.

EXCOECARIA.

240. E. Agallocha. *Rumph. amb.* 2. 235. t. 79. 80.

Locus: Insulae Moluccae in rupibus ad mare
fitis: Amboina, Ternate. *Arbor.*

Qualitas: succi, quo tota arbor turget, quem-
ve fauciatata circa circum spargit, acerrima,
lactescens.

Vis: inflammans cet.

Effectus: *extern.* Vehementissimi Dolores,
Inflammatio, Tumor; Ophthalmia, Coe-
citas.

PENTANDRIA.

CANNABIS.

241. C. sativa. *Mill. dict. ic.* t. 77. *Rumph. amb.*
5. t. 180. *Blackw.* t. 322. a. b.

Locus: India orientalis: Iaponia, Persia.

Annua, cicur.

Qualitas: sem. subfativa; cort. folior. magis
succo et sumitatum, ac maxime pollinis
(quo Indi opium adulterare feruntur) ha-
lituosa.

Vis:

241. Pereunt pisces, in quorum aquis *Cannabis* maceratur.
Scythae, *Cannabis* seminibus lapidi feruifaculo impositis vapo-
rem, inde adscendentem, inspirando se se inebriant et stupe-
faciunt. Secta Mystica in Aegypto degens a cannabis foliis
et aqua conficit electuarium, cuius circiter Drachmam vni-
eam vel duas, siue interdum maiorem quantitatem quinquies
sumunt; hora prima elapsa ebrii et deliri fiunt.

Vis: exhilarans, inebrians, dementans, soporifera.

Effectus: Narcosis.

ENNEANDRIA.

MERCVRIALIS.

242. *M. perennis. Fl. dan. t. 400.*

Locus: Europae montes nemorosi.

Perennis, infrequens.

Qualitas: herb. acris.

Vis: hypnotica, stupefaciens, purgans.

Effectus: Vehement. Vomitus et Alui Fluxus, Ardor Encephali, Dolores arthritici, Sopor, interdum Mors.

DECANDRIA.

CORIARIA.

243. *C. myrtifolia. Angl. hortul. 64. t. 20. f. 1.*

Lob. ic. 2. 98.

Locus: Monspelim, Italia, Hispania.

Frutex.

Qualitas: folior. maxime baccar. vaporosa.

Vis: conuulsiua, stupefactiua.

Effect.

242. Etiam ouibus, non ita capris perniciofa est.

243. Folia et afinis, capris, ouibus vertiginem, conuulsiones, sensuum abolitionem, interdum lethalem excitant. Folia iuniora et gemmae minus nociua sunt. Baccae XV. virum eodem die, quo eas adsumserat, necarunt praegressis consuetis symptomatibus, quamuis sumto emetico VIII-IX. euomuerat. Attamen alii adfirmant, capris Italicis et afinis Pyrenais folia esse innocua.

Effectus: Totius corporis Conuulsiones, Anæsthesia, Mors.

DODECANDRIA.

MENISPERMVM.

244. *M. Cocculus*. *Rheed. mal.* 7. t. 1. f. 1. *Pluk. alm.* 43. t. 13. f. 2. *mant.* 52. t. 545. f. 2. *phyt.* 345. f. 2. *Rumph. amb.* 5. 35. t. 22. *Blackw.* t. 389.

Locus: Indiae orientalis: Malabariae, Zeylo-nae, Iauae, Amboinae et Celebes saxosa.

Arbor, peregrina, fera.

Qualitas: baccar. aut potius nuclei amarissima, acerrima.

Vis: stupefaciens, phthiriaca.

Effectus: Spasmus, Haemorrhagia, Nausea, Hyperemesis, Hypercatharsis, Lipothymia; Mors ni hominum, saltem brutorum.

MONADELPHIA.

IVNIPERVS.

** I. *Sabina* inspectus videtur.

TA-

244. Quatuor grana audissime a iuvene comesta nauseam, singultum et animi angustias induxere. — Baccarum pulvere in esca exposito pisces, psittaci aliaeque aues, crocodili et aliae ferae capiuntur.

TAXVS.

245. *T. baccata*. *Du Ham. arb. 2. t. 86. Blackw. t. 572. Bulliard herb. de France t. 136.*

Locus: Europae, Canadae montes saxosi sylvaeque tenebrae.

Arbor, infrequens.

Qualitas: fol. viscida, mucosa; baccar. insipida; sem. amara.

Vis: irritans, sanguinem resoluens, narcotica?

Effectus: Lethalis Emesis (frond.)? Diarrhoea, Febris ardens, Strangulationis sensus, Frigus vniuersale (sem.); Cephalalgia (exhalatione)? — Saltim iumentis, capris et ouibus frondes deleteria sunt.

245. Pueri corpus, deglutitis baccis rubris, fere totum lividae maculae absque febre occupabant petechiales cum liquaminis rubri vomitu subitaque virium prostratione, quae XIV diebus post sine vlla mentis perturbatione mors excipiebat tranquilla; cadauer dissectum ventriculum vix inflammatum, et muco nigricante obductum monstrabat. Interdum vero baccae impune deglutiebantur ab infantibus; et in Anglia a suis, ut glandes deuorantur. Aues a baccis inebriantur atque a nimia istarum copia pereunt.

CLASSIS XXIII.
POLYGAMIA.

MONOECIA.

VERATRUM.

246. V. album. *Mill. dict. 1. ic. t. 271. Bulliard herb. de France t. 149. Gunn. noru. n. 315. t. 1. Iacq. austr. t. 335. Ludw. ed. t. 137. 138. Blackw. t. 74. Weinmann. t. 528. c. d.*

Locus: Russia, Sibiria, Austria, Heluetia, Italia, Graecia in montosis humidioribus.

Perennis, cicur.

Qualitas: rad. inprimis recent. acerrima, subamaricans, subadstringens, nauseosa, diu inhaerens.

Vis: draastica, emetica, septica, inflammans, subnarcotica; semin. debilior.

Effectus: *intern.* Inflammatio Gangraena, Hyperemesis, Singultus, Hypercatharsis cruenta, Tumor abdominis, Convulsiones omnium partium, Cephalalgia, Vertigo, Aphonia, Coecitas, Anxietas, Insipientia, Lipothymia, Apoplexia, Resolutio sanguinis, Frigus, Mors, non nunquam, subita; *extern.* Sternutatio periculossima, vehement-

246. Radicis in caute effossae effluvia horrendum vomitum excitarunt. Plantam omnes pecudes, vtpote ipsis lethalem, excepto mulo, auide illam inuestigante, auersari, HALLERVS refert. Delphinatus incolae ouibus suis *V. albi* pastu venenatis *Helleborum foetidum* vt antidotum praebeant. Radix destillatione spiritum largitur valide causticum.

mentes Vomitus (abdomini imposit.) cet.

— Toxicum sagittar.

** V. nigrum *Sabadillae* vires habere dicitur.

V. nigri cum *V. albo* vno eodemque loco culti, folia a limacibus plane corrodi, minime vero *albi*, MILLERVS adfirmat.

** V. luteum debilius est huiusque nullus prae-
vus effectus innotuit.

** V. Sabadilla, in Mexico habitans, summum quidem et innocuum anthelminthicum ac antiphthiriacum est, nec facile, nisi ad Drachmam dimidiam vel integram datum, ventriculi ardorem, nauseam et vomitum creat; etiam mors, quam praegressis convulsionibus, remedia adhibita respicientibus, *Sabadilla* intulit cuidam infanti, cuius caput nutrix feminis pulvere conspererat, ab irritatione, quam pediculi motibus suis, quos illis semen inducere videtur, convulsivis, deriuari potest. Attamen maniam aliosque effectus, quales *Veratrum album* habere solet, produxisse fertur; id quod omnino verosimillimum est, si semen, quod saporis amarissimi et acerrimi est et masticatum linguam faucesque acrimonia caustica et pungente sua subito adficit, recens fuerit.

POSSIRA.

247. P. arborescens. *Aubl. guian.* 234. t. 355.

Locus:

Locus: Guiana.

Arbor.

Qualitas: sem. acerrima, nauseosa.

Vis:

Effectus: Inflammatio, Tumor. A VBL.

ATRIPLEX.

- ** *A. hortensis* antiquioribus suspectus fuit; seminum quidem maior copia superne et inferne purgat.

MIMOSA.

248. *M. sensitiva*. *Breyn. cent. 31. t. 16. Trew. ebret. t. 95.*

Locus: Brasilia, Surinamum. *Frutex, mansuetus.*

Qualitas: plant. vel succi —

Vis: venenosa.

Effectus: Mors tardior citiorque; a parva et repetita dosi Acrimonia Humorū, dein Hectica.

- ** *M. pudicae* rami et folia venenata esse, et Indi artem ex illa venenum lentum parandi callere dicuntur. Cuius vero antidotum quod solae radices istius foetidae sint, superstitionem sapit. Ceterum nullum animal plantam pascitur.

249. *M. farnesiana*.

Locus: Domingo, Surinamum.

Frutex, mansuetus.

Qualitas: flor. halituosa, foetida.

Vis: narcotica.

L 2

Effect.

Effectus: Animi Deliquium. Sub vmbra fruticis florentis recubantes Lethargo corripiti solent, quo postea per totam vitam adfliguntur.

TRIOECIA.

FICVS.

** F. Caricae succus lactescens, septicus, amarus atque fructus immaturi superne et inferne cum torminibus purgant.

** F. Sycomori fructus febrem tertianam inducere TORTI narrat. Attamen alii illis impune vesciebantur.

250. F. toxicaria.

Locus: Sumatra.

Arbor.

Qualitas: fructus — —

Vis: venenatissima. GARCIN.

Effectus:

251. F. grossularioides. *Burm. ind. p. 227.*

Locus: Suratta.

Qualitas: fruct. — —

Vis: venenata.

Effectus:

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

CYCAS.

252. *C. circinalis.* *Seb. thes.* 1. 39. t. 25. f. 1.
Rumpf. amb. 1. 86. t. 22. 23. *Rheed. mal.* 3. 9.
 t. 13-21. *Linn. Pfl. syst.* 1. 74. t. 2. f. 3. 4.
Iacq. act. helv. 8. 59. t. 2.

Locus: India: Insulae Moluccae fere omnes,
 et circumiacentes; Amboina, imprimis
 Ceram.

Qualitas:

Vis:

Effectus: Noxio fructuum succo expresso In-
 di infantes suos sibi molestos tollunt. Ce-
 terum fructus debito modo parati alimen-
 tum praebent.

FVNGI *).

AGARICVS.

253. A. Cantharellus. *Fl. dan. t. 264. Schaeff. fung. t. 82. Vaill. parif. t. II. f. 9. 10.*

β *Vaill. parif. t. II. f. II. 12. 13.*

γ — — — 14. 15.

Locus: Prata, fyluae; Augusto, Septembri.

Copiosus.

Qualitas:

Vis:

Effectus: Dira Tormina, Diarrhoea.

254. A. integer. *Sthaeff. fung. t. 58. roseus 75. 87. 88; ruber 92; cyanoxanthus 93 et virens 94. Buxb. cent. 4. 12. t. 19.*

Loc.

*.) Fungi vix non omnes vile praebent edulium, et largius saepiusque comesti prauos generant humores ita, ut temporis tractu sanitati quam maxime obesse valeant. Eominus me impegiſſe credo, ſi fungos, alias eſculentos, pernicioſis inferere non dubitauerim, quum inter omnes conſtet, illorum plurimos, et quidem, ut videtur, per aetatem atque ex loci genio noxias adſciſcere qualitates. Quibus adcedit, quod praeter mucum ſuum viſcidum, et interdum adſtringentem, multis vermium millibus perſaepe domicilio ſint, ac etiam ob perbreuem vegetationis terminum citius putreſcant, atque vermes et putredo fungi interanea exedant, externa facie, ut videtur, illaeſa. Longe itaque ſatius eſt, alimento huiusmodi ancipiti carere, quam cum ſanitatis et vitae diſcrimine in cibum ſumere, utut uſum fungorum cibarium, quorum innocentiam certis ſignis definire valemus, plane non interdici velim. — In Sibiria, Bohemia pluriſimi fungi paucis exceptis eduntur,

253. Hoc ſaepe abſque noxa cum carnum iure cocto uſus eſt ill. HALLERVS.

Locus: Syluae; Auctumno.

Qualitas:

Vis: emetica.

Effectus:

255. *A. muscarius*. Mich. gen. t. 78. f. 2.
Schaeff. fung. t. 27. et 28. variet. absque verrucis. *A. pseudoaurantiacus* Bulliard herb. de France. t. 122. *A. oliuaceus.* Schaeff. fung. t. 204.

Locus: Prata, Syluae; Augusto, Septembri.
Frequens.

Qualitas: foetida, acris.

Vis: narcotica.

Effectus: — Cimices necat et eradicat promississime.

256. *A. Necator.* Bulliard herb. de France t. 14.
A. torminosus Schaeff. t. 12.

Locus: Syluae; Augusto, Septembri.

Qualitas: lactescens, acerrima.

Vis:

L 4

Effect.

255. Secundum Cl. OEDMANNI opinionem (Abhandl. der königl. Akad. der Wissensch. 1784. quartal 3.) antiquorum athletarum (Bersekar) septentrionalium rabies furiosissima ab esu huius agarici erat. — Kamschadali ex agarico hoc et *Epilobio angustifolio* potum parant inebriantem, qui delirium, tremorem, furorem cet. excitat potanti. Etiam muscae hunc fungum comedentes stupidae evadunt, post de novo in vigorem restituuntur. Feles canesque necavit. Non sine periculo ab incautis loco *A. aurantiaci* (Bulliard herb. de France t. 120.) ad cibum recipitur; an inde *A. muscarius* verus in Russia, Germania et Gallia, vt relatum legi, edatur?

256. Secundum cl. BULLIARDVM, LINNAEVS aliique hunc cum *A. delizioso* confuderunt.

Effectus: Linguam adurit cet. — Ab insectis non tangitur.

257. *A. pustulatus*. *Pollich. hist. plant. tom. 3. n. 1158. Paulet. pl. 12.*

Locus: Pineta; Octobri.

Qualitas:

Vis: venenata.

Effectus:

258. *A. piperatus*.

Locus: Palcua, Syluae; Augusto, Septembri, Octobri.

Qualitas: lactescens, acris.

Vis: drafrica.

Effectus: Vomitus, Diarrhoea, Lipothymia.

259. *A. bulbosus vernus*. *Bulliard herb. de France t. 108.*

Locus: In sylvis Galliae; vere.

Qualitas: odoris et saporis ingrata.

Vis:

Effectus: Per octo minuta in ore detentus calorem excitat piperis instar; plures necavit eo per errorem loco *Agarici campestris* in cibum vsos.

260. *A. viscidus*.

Locus: Agri, Syluae; Autumno.

Qualitas:

Vis:

Effectus:

261. A.

258. Editur in Prussia et Curlandia.

259. Anne *A. piperatus*?

261. *A. clypeatus*. *Schaeff. fung. t. 22, 23. Fl. dan. t. 772.*

Locus: Prata syluatica.

Qualitas:

Vis:

Effectus:

262. *A. fimetarius*. *Schaeff. fung. t. 7. 8. 46. 47. Mich. gen. 181. t. 80. f. 3. et t. 74. f. 6. Sterb. fung. 218. t. 22. f. I. K. L. Buxb. cent. 4. 16. t. 27. f. 1.*

Locus: Ad sepes et fimeta; Septembri.

Qualitas:

Vis: pernicioſa.

Effectus:

263. *A. stypticus*. *Bulliard herb. de France t. 140.*

Locus: Lignis putridis infidet.

Qualitas: styptica.

Vis:

Effectus: Faucium Conſtrictio.

264. *A. radicosus*. *Bulliard herb. de France t. 160.*

Locus: Syluae; Septembri, Octobri.

Qualitas: maſticat. acris, deteſtabilis. Suſpectus!

Vis:

Effectus:

265. *A. sanguineus*. *Bulliard herb. de France t. 42.*

Locus: Syluae circa Pariſios; Auguſto, Septembri.

Qualitas: Non lactescit, inodorus est, sed tandem odorem ingratum spirat.

Vis:

Effectus: — Linguam adurit et vesicas elicit.

Suspecti sunt:

AGARICVS pileo cucullato, viscido et nigro, petiolo fistulato, candido. *Cartheus. Catalog. pl. sponte circa Giff. nasc. p. 185.*

a. pileo plano, viscido, citrino et splendente, vertice in conum acutum fastigiato, lamellis rarioribus. *Cartheus. l. c. p. 130.*

a. candidus et viscidus ex vna basi multiplex; pileo campanulato, in centro depresso, petiolo cylindraceo, gracili *Cartheus. l. c.*

AMANITA coniformis viscida, lutea (anne *Agaricus dentatus L.*); et

a. globoso - viscida, fordide lutea Dillenii. *Gleditsch. p. 109.*

BOLETVS.

** B. luteus (*Schaeff. fung. t. 114. Dill. giff. 18. t. 10. n. 1. Buxb. cent. 5. p. 7. t. 14. Bulliard herb. de France t. 4.*) odoris aliquantulum sulphurei, mucilaginosus, fere insipidus, suspectus est.

HYDNVM.

** H. repandum. (*Schaeff. fung. t. 141. et t. 318. Fl. dan. t. 310. Dill. giff. t. 1. Mich. gen. 132.*

t. 72.

t. 72. f. 3. Bulliard herb. de France t. 172.)
initio lapidum, postea acre, ingratum, sus-
pectum est.

PHALLVS.

266. Ph. impudicus. *Fl. dan. t. 175. Schaeff.*
fung. t. 196-198. Act. Stockh. 1732. 20. t. 2.
f. 1. Mich. gen. 201. t. 83.

Locus: Syluae.

Qualitas: acris. Colliquefcendo foetidissi-
mum virosum halitum exspirat.

Vis: aphrodisiaca, abortiua,

Effectus:

267. Ph. Mokusin. *Suppl. pl. C. a Linn. 452.*
Act. petrop. v. 19. p. 373. t. 5.

Locus: China prope Pekin in *Mori* radicibus
putridis et ipsis in foliis semiputridis. —
Vegetationem intra 12 hor. absoluit, qua ab-
soluta flaccescit et putrescit.

Qualitas: saepissime verminosa.

Vis: venenata, (anticancrofa.)

Effectus:

PEZIZA.

** P. Auricula, quam alii perniciosam culpant,
eiusmodi indolis plane non esse videtur.

LYCOPERDON.

268. L. Bouista.

Locus: Campi steriles.

α. L. verrucosum. *Bulliard herb. de France t. 24. Vaill. t. 16. f. 5-7. Hall. hist. n. 2172. A. β.*

Effectus: Pulvis, quem exsiccatu reddit, oculis naribusque exceptus violentas Inflammationes excitat. Interne sumtus venenatus esse dicitur.

β. L. pyriforme. *Bulliard herb. de France t. 32. Schaeff. t. 185. Hall. hist. n. 2172. B.*

Effectus: Pulvis naribus exceptus Sternutationem violentam, Haemorrhagias; oculis inspersus Ophthalmiam, Epiphoram inducit.

269. L. stellatum. *Schaeff. fung. t. 182. Fl. dan. t. 360. Buxb. cent. 2. 45. t. 49. f. 3. Mich. gen. 220. t. 100. f. 1. 2. 3. Rai. angl. 3. 27. t. 1. f. 1. Bocc. mus. 1. t. 305. f. 4.*

Locus: Colles, sylvae.

Qualitas: Pollen grauem et foetidum spirat odorem.

Vis:

Effectus: — — Pollen oculis inimicum, immo perniciosum censetur.

Etiam

268. *Bouista* fibras constringendo sanguinem eximie quidem cohibet et crustam vulneratis partibus inducit; sed exedendo et exsiccando consolidandarum partium restorationi magis officit.

Etiam *Lycoperdon ceruinum*, *aurantiacum*, *Carpobolus* et *carcinomale* (*Suppl. pl.*) suspicionem praebere videntur. Quin non nullis omnia *Lycoperda*, excepto *Tubere*, venenata dicuntur.

FVNGI NONDVM IN SYSTEMATA
RECEPTI.

270. FVNGVS phalloides annulatus fordide virescens et patulus. *Bulliard herb. de France t. 3. Vaill. paris. t. 14. f. 5. Schaeff. fung. t. 85. 86. Mem. de la Societ. Roy. d. Med. 1776. p. 438. v. et alter pl. 6. f. 1. 2. Agaricus est.*
Locus: Parisi.

Qualitas: Iunior insipidus et inodorus est; adultus fuscescit, odoremque cadauerosum, intolerabilem exhalat.

Vis:

Effectus: — — Huius Drachma vnica animalibus data post quatuor horas inducebat Debilitatem, Suspiria, Vomitus, totius corporis Tremorem, Mortem.

271. FVNGVS bulbosus cruciformis odoratissimus. *Paulet. pl. 10. f. 2. p. 447.*

Locus:

Qualitas:

Vis:

Effectus: Vehementes Dolores colici, Diarrhoea, Mors.

APPENDIX.

PALMAE.

CARYOTA.

272. *C. vrens.* *Rumph. amb.* 1. 64. t. 14. *Rheed. mal.* 1. 15. t. 11.

Locus: India.

Arbor, peregrina.

Qualitas: fructus carnosus acerrima. Multo vehementius vrit, quam fructus *Sagueer* (vid. infra post *Phoen. dactylif.*)

Vis:

Effectus:

COCCOS.

** *C. nucifera.* Nucis succo intus contento, dulci, mox vero acescenti, abutentes vel ieiuno ventriculo, siue illi non adfueti haurientes molestissimam colicam et paralyfin experiuntur.

PHOENIX.

** *PHOENICIS* dactyliferae fructus, praecipue in Gallia et Lusitania crescentes, immaturi insalubres sunt, ventriculum grauant, obstructions, colicam aliosque curatu difficiles morbos gignunt.

** *SAGVEER* (ad genus *Elates* pertinere videtur, vid. *Houttuyn. Pfl. syst.* 1. 160. t. 4. f. 2.), palma, cuius locus natalis est India; Iauae ora orientalis, Insulae Moluccae in vallis vmbro-

umbrosis, vt et Manada, quae est prouincia in insula Celebs. Fructuum maturorum vel semimaturorum (qui conditi gratum cibum praebent) caro succulenta solo tactu vehementem, ardentem dolorem, et degustata labiorum tumorem intensum et aliquot diebus post adhuc dolentem excitat. Etiam aqua, in qua fructus macerati vel putrefacti sunt, corpori adfusa ardorem infert vix mitigandum. Indi quondam aqua hacce in defendendis propugnaculis suis vsi sunt et Europaeos illa infuderunt, qui inde aquam istam dixere *infernalem*. Dum arbor fructibus superbit, quod ipsi tamen semel tantum per totum vegetationis suae decursum contingit, etiam riui et aquae vicinae praeter fluentes a fructibus delapsis temerantur. Vini, ex succo, quem fauciatus truncus effundit, parandi abusus humores et adpetitum deprauant, pallorem, hydropem, paralyfin (Indis *Beriberi* dictam), aliis acredine sua haemorrhagias, ebrietatem cum subsequente cephalalgia acuta infert. Aues et pisces, qui furculis huius palmae, in modum ferruginis adhibitis, infixi torrentur, vescentibus vertiginem inferunt, et tela ex ligno illius confecta vulnera pravae saepe indolis infligant.

** NIBVN vel NIEBOOM (*kleiner Saguaster* *ibid.*) in insulis Moluccis habitans. Fructus caro, vt praecedentis vrit.

MISCELLANEA.

273. AGALLOCHVM. *Rumph. amb. 2. t. 9. Kaempf. omoen. 903. t. 902. f. 2.*

Locus: China. *Arbor, peregrina.*

Qualitas: ligni lactescens, resinosa, amara; medullae trunci amarissima.

Vis: venenatissima, excorians, inebrians, anthelminthica.

Effectus:

274. IATROPS umbellata. *Rottboell. act. Hafniens. 1778. 293.*

Locus: Surinamum.

Qualitas: aromatica, graueolens.

Vis: narcotica.

Effectus: Folia naribus admota Cephalalgiam, Vomitum, Diarrhoeam excitant; folia contrectare incolae metuunt ob foetorem, et post vnum alterumque diem ablutioni cedere renuentem.

275. CALCEOLARIA frutescens. *Rottboell. act. Hafniens. 1778. 298. An Viola fruticosa aut Viola Calceolaria L.?*

Locus: Surinamum.

Qualitas: femin. amygdalacea, post linguam, labia faucesque corrodens et inflammans.

Vis:

Effectus:

276. FRUTEX EXCOECANS. *Rumph. amb. 4. 129.*

Locus: Amboina, Iaua, Baleya, Celebes ad
oras sylvarum, in vallibus, campis et mi-
noribus syluis. *Arbuseula.*

Qualitas: lactis, vulneratis ramis, et maiori
copia petiolis abruptis exstillantis primum
candida, ficci caerulefcens.

Vis: Arbore excoecante magis toxica.

Effectus: — — Attamen Ternatenses radi-
cem interne adhibent.

277. VPA Malaiis Iauanisque, IPÙ Macassa-
rienfibus. *Kaempfer. amoen. p. 575. Miscell.*
Acad. Nat. Cur. Dec. 2. ann. 3. p. 230. Locön.
de Mungos in Valentini India litterata p.
542. Goetting. Calend. 1784. — Habitat in
Montibus Insulae Celebes, aliarumque ad-
iacentium, item Iauae. Arbor *Caryo-*
phyllo aromatico quoad proceritatem et fo-
lia fimilis effe dicitur a NEVHOFIO; tri-
plex tamen varietas vel fpecies arboris exi-
ftere perhibetur, fecundum colorem suc-
ci (fufcum, rufum et albicantem) et ma-
lignitatem differens; KAEMPFER. Ar-
bor omnia circumcirca animalia, immo
etiam vegetabilia delere fertur effluuiis ve-
nenatis, quare fuccus, qui fufcus effe feu
obfcure ruber ex eminus vulnerata arbore
magno cum periculo arundinibus excipi-
tur, et exficcatu forma globulorum vel
granorum ad regulos Macaffarienfes defer-
tur, qui eum aqua mollitum, addita Lam-

M

pogang,

pogang, planta Scitaminea, quae *Lampuiang* KOENIG. descr. monandrarum in RETZII obs. bontan. fasc. 3. p. 62. telorum cuspidibus illinunt. Hoc est *venenum illud Macassariente* GMEL. *allgem. Gesch. der Pflanzen* p. 487.

278. THAPSIA Caesalpina femine candido crasso I. B. I. *Raii hist. pl. 1. 419.* — Radicis succus lacteus valde acris est, vt tractantium et manus et faeies tumescant.

279. APOCYNVM mexicanum *Trapezentli* dictum seu spicis Mayzii montani FR. HERNANDEZ *Raii hist. pl. 2. 1089.* — Radix degustata virus minime ingratum olet, *Paemoniae* simile; sensum aliquem caloris, ne dicam vredinis praebet circa guttur. Radicis tustae Drachmae tres ex aqua deuoratae omne humorum genus supra infraque euacuare dicuntur.

280. PRVNIFERA Malabarica fructu racemoso, paruo, acri, succo tinctorio Katoutieroe siue Cheru *H M. 4. t. 9. p. 10. Rai. hist. pl. 2. 1547.* — Succus e fructibus et arboris cortice expressus tumoribus frigidis adplicatus cutem erodendo ac vesiculas excitando eos adperit. Reperiuntur inter Indos, quibus arbor haec noxium est venenum, atque ex leui eius adtactu totum corpus mirum in modum intumescit;

mescit; quod symptoma lacte, butyro aut oleo adsumto protinus mitigatur.

281. FRUTEX brasiliensis baccifer fructu umbilicato tricocco, Iuniperino simili. Monaca MARCGR. PISON. *Rai hist. pl. 2. 1612.* — Floris odor suavis instar *Violae odoratae*; radix amara, acris corpus nimis violenter superne et inferne mouet, non secus ac *Scammonium* vel *Esula*.
282. ARBOR filiquosa Guinensis lobo spadiceo fusco c. b. Magnus lobus ex Guinea clvs. Lobus magnus ex Guinea foetidus cum granis arboris Iudae i. b. *Raii hist. pl. 2. 1773.* — Siliquae medulla s. pulpa grauis odoris est, caput ferientis, immo cerebrum offendentis. Grana intus adsumta perniciofa sunt.
283. TANGARAEA I. PISONIS. Erua de Rato MARCGR. Frutex brasiliensis venosus, floribus umbellatis rubris. *Raii hist. pl. 2. 1784.* — Flores et folia praesentissima sunt venena. Radix mox exhibita tutum apud incolas remedium.
284. TANGARAEA III. PISONIS. Frutex brasiliens. venosus floribus umbellatis aureis. *Rai hist. pl. 2. ibid.* — In foliis floribus et seminibus tam alte posita est vis deletoria, vt vel ex leuissimo eorum gustu corpus

pus intumescat, mens turbetur, vertigines animique deliquia oboriantur, denique mors ipsa sequatur, nisi quantocyus praesentissimo remedio obuiam eatur.

285. ANDIRA vulgo Angelyn PISONIS MARCGR. Arbor nucifera brasiliensis fructu oui figura et magnitudine. *Rai hist. pl. 2. 1687.* — Cortex, lignum et fructus, instar *Aloes* amarissimi sunt. Tracto duro putamine nucleus adparet ex albo flavesceus, amarican-
tis et ingrati saporis cum adstrictione quadam, cuius pulvis ventris lumbricos expugnat, ea tamen cautione, vt iufra scrupuli pondus exhibeatur, ne medicamentum in venenum abeat!

286. COLOCASIA hederacea sterilis latifolia; rupibus aut arboribus adhaerescit *Hederae* instar. *Rai. hist. pl. 3. 587.* An *Pothos Palmata* L.? Causticum est satis violentum; degustanti os adeo inflammavit, vt per decem dies omnem saporis sensum perdiderit. Ab incolis *funis vrens* nominatur. habitat in forestis insulae Dominici multis in locis.

287. LAVRIFOLIA arbor venenata, folio acuminato, copiosum lac praebens, ex quo inspissato viscus aucupum paratur. SLOAN. Cat. Iamaic. — Galactoxylon s. arbor
ameri-

americana baccifera, lacteum liquorem ex ligno fundens, qui durus instar gummi euadit PLUK. Phytogr. T. 185. f. 1. Rai. hist. pl. 3. 87. sub titulo: *Arbores fructu sicco*. — Omnibus suis partibus copioso lacte turget et venenosa admodum habetur. — An *Hippomane Mancinella* L.?

288. STRAMONIVM LVZONIS primum, clusio Datura vel Burladora, Donna bella Hispanis. Rai. hist. pl. append. 3. 15. Radicis contusae cum vino expressum succum hauriens post profundum somnum aliquot dies mansit attonitus delirando. Oleum ex semine pressum volis manuum inunctum somnum conciliat.

289. s. l. alterum. *Ibid.* — Semen in parua dosi somnum conciliat. Huius pomum dimidium in vino expressum hauriens, dormiuit triduum profunde, sudore diffluens et saepius vrinam reddens, expergefactus quasi attonitus mansit.

SUSPECTAE.

** Bulbus liliaceus vomitorius Capitis Bonae Spei BREYNII. Rai. hist. pl. 2. IIII.

Emeticus et purgans est,

** Peno absou, arbor americana I. B. Arbor fructu orbiculari venenato c. B. *Rai. hist. pl. 2. 1803.*

** Adamboe H. M. 4. 20. 21. 45. Alcea-indica arborea pericarpia carnosio in plura loculamenta partito. *Rai. hist. pl. 2. 1902.*

Ex arboris cortice, foliis (quae odoris syluestris et saporis subadstringentis sunt) ac floribus cum aqua decoctio paratur, quae pota hepatis, lienis aliorumque vicerum obstructions aperit et aquas hydropicorum per aluum et vrinam potenter educit. Semen haud secus, ac *Coriandri* semen capiti infestum est, ac vertiginem, ebrietatem similesque effectus producit.

** Katou-Theka-Maruara, H. M. 12 25. Parasitica indica bulbifera, foliis angustis, sterilibus. Maximarum densissimarumque sylvarum arboribus insidet vetustissimis. Rarissime inuenitur. *Rai. hist. pl. 3. 653.* Radix ficcata, in folliculis reposita serpentes abigit, in puluerem redacta et adsumta veneno resistit ex morfu canis rabidi contracto, vulnera et omnem illorum malignitatem sanat. Bulbi dissecti et affati omnia apostemata resoluunt. Bubulis venenum est; furibundi enim euadunt de ea comedentes.

- ** *Iatrops myristicoides* (*Act. Hafniens.* 1778. 293.) Surinami in sylvis habitans, amara tonica, emetica est.
- ** *Gumira litorea* (*Rumph. amb.* 3. 209.) arbor in Indiae saxosis habitans. Folia, penetrantem odorem spirantia, in olus cocta vertiginem excitant.
- ** *Ichthyoctones Litorea*, Aytuy (*Rumph. amb.* 3. 213.) arbor ad litora habitans, cortice vulnerato vel folio abrupto lac spissum exsudans; fructus a nullo animali expetuntur. Incolae corbiculos quosdam recentibus his fructibus grosso modo contusis, cineribusque mixtis, impletos in aquarum oclusos locos deponunt, et aquam tunc fustibus turbant et commouent, donec horum nucleorum spuma obducta sit; tum omnes pisces in illo loco oclusi semimortui supernatant, impune comedendi Nuclei in fructibus contenti instar Canariorum dulcescunt, et a pueris maturi absque noxa eduntur.
- ** *Ichthyoctones montana*, Walan (*Rumph. amb.* 3. 214.) arbor in altis Hiroensium montibus et Toyae densis sylvis habitans. Cortex radicis rubrae ad pisces enecandos adhibetur eodem modo, ut de praecedentis fructu dictum est; acri corticis puluere

piscium oculi inflammantur. Pisces sic semimortui capti aquis recentibus, in quibus tamen diu seruari nequeunt, immittuntur et tunc sine nocumento comeduntur. Homines aquae, quae potata oris ardorem excitat, immissi, cutis pruritus solummodo patiuntur.

** Pomum Hiericonteum *Rai. hist. pl. 3. append. p. 25.* Semen piscationi inseruit medicae, et Crocodilos necat, ut cocculus Leucanticus.

*

*

*

Venena, quae Indi *Pinang* suo (quod est masticatorium et *Nicotianae* succedaneum) admiscunt, fascinationem et tabem inducentia, nota nondum sunt.

INDEX

GENERVM ET SPECIERVM

VEGETABILIVM VENENATORVM.

Secundum numerum.

| | | | |
|------------|--------------------------|--|-----|
| A | | | |
| brus | <i>precatorius</i> | | 204 |
| Aconitum | <i>Lycostonum</i> | | 166 |
| | <i>Napellus</i> | | 167 |
| | <i>pyrenaicum</i> | | 168 |
| | <i>Cammarum</i> | | 169 |
| Actaea | <i>spicata</i> | | 154 |
| | <i>racemosa</i> | | 155 |
| Aethusa | <i>Cynapium</i> | | 84 |
| Agallochum | | | 273 |
| Agaricus | <i>Cantharellus</i> | | 253 |
| | <i>integer</i> | | 254 |
| | <i>muscarius</i> | | 255 |
| | <i>necator</i> | | 256 |
| | <i>pustulatus</i> | | 257 |
| | <i>piperatus</i> | | 258 |
| | <i>bulbosus vernus</i> | | 259 |
| | <i>viscidus</i> | | 260 |
| | <i>clypeatus</i> | | 261 |
| | <i>finetarius</i> | | 262 |
| | <i>stypticus</i> | | 263 |
| | <i>radicosus</i> | | 264 |
| | <i>sanguineus</i> | | 265 |
| Alisma | <i>Plantago aquatica</i> | | 106 |
| Aloe | <i>spicata</i> | | 104 |
| Amaryllis | <i>farniensis</i> | | 100 |
| Anacardium | <i>occidentale</i> | | 118 |
| Anagyris | <i>foetida</i> | | 119 |
| Andira | | | 285 |
| Anemone | <i>Pulsatilla</i> | | 171 |

| | | |
|--------------|-------------------------|-----|
| Anemone | <i>pratensis</i> | 172 |
| | <i>palmata</i> | 173 |
| | <i>sylvestris</i> | 174 |
| | <i>nemorosa</i> | 175 |
| | <i>ranunculoides</i> | 176 |
| Angelica | <i>atropurpurea</i> | 77 |
| Annona | <i>muricata</i> | 170 |
| Apocynum | <i>androsaemifolium</i> | 71 |
| | <i>canabinum</i> | 72 |
| | <i>mexicanum</i> | 279 |
| Arbor | <i>siliquosa</i> | 282 |
| Arum | <i>Dracunculus</i> | 213 |
| | <i>Dracontium</i> | 214 |
| | <i>musciferum</i> | 215 |
| | <i>Colocasia</i> | 216 |
| | <i>esculentum</i> | 217 |
| | <i>trilobatum</i> | 218 |
| | <i>maculatum</i> | 219 |
| | <i>virginicum</i> | 220 |
| | <i>ouatum</i> | 221 |
| | <i>arborescens</i> | 222 |
| | <i>seguinum</i> | 223 |
| Asarum | <i>europaeum</i> | 130 |
| Asclepias | <i>gigantea</i> | 73 |
| Atropa | <i>Mandragora</i> | 43 |
| | <i>Belladonna</i> | 44 |
| Azalea | <i>pontica</i> | 21 |
| B | | |
| Barringtonia | <i>speciosa</i> | 203 |
| Bauhinia | <i>coccinea</i> | 120 |
| Bryonia | <i>alba</i> | 239 |
| C | | |
| Calceolaria | <i>frutescens</i> | 275 |
| Calophyllum | <i>Inophyllum</i> | 160 |
| Cambogia | <i>Gutta</i> | 158 |
| Cannabis | <i>sativa</i> | 241 |
| Capicum | <i>truncatum</i> | 51 |
| Caraipa | <i>angustifolia</i> | 153 |
| Caryota | <i>vrens</i> | 272 |
| Cerberae | <i>Athouai</i> | 61 |
| | <i>Manghas</i> | 62 |
| | <i>Thewetia</i> | 63 |
| | Cestrum | |

| | | |
|---------------|-----------------------|-----|
| Cestrum | <i>nocturnum</i> | 55 |
| | <i>venenatum</i> | 56 |
| | <i>leptophyllum</i> | 57 |
| Chaerophyllum | <i>sylvestre</i> | 87 |
| | <i>bulbosum</i> | 88 |
| Chelidonium | <i>Glaucium</i> | 156 |
| Chenopodium | <i>hybridum</i> | 74 |
| Cicuta | <i>vireosa</i> | 82 |
| | <i>maculata</i> | 83 |
| Clematis | <i>Vitalba</i> | 177 |
| | <i>flammula</i> | 178 |
| | <i>erecta</i> | 179 |
| Cleome | <i>gigantea</i> | 201 |
| Cneorum | <i>triloccon</i> | 3 |
| Colchicum | <i>autumnale</i> | 105 |
| Colocasia | <i>hederacea</i> | 286 |
| Conium | <i>maculatum</i> | 76 |
| Conuoluulus | <i>Scammonia</i> | 25 |
| | <i>Turpethum</i> | 26 |
| | <i>Ialapa</i> | 27 |
| | <i>Soldanella</i> | 28 |
| | <i>Pes Caprae</i> | 29 |
| Coriandrum | <i>satium</i> | 85 |
| | <i>testiculatum</i> | 86 |
| Coriaria | <i>myrtifolia</i> | 243 |
| Crocus | <i>satiuus offic.</i> | 4 |
| Croton | <i>Tigium</i> | 226 |
| | <i>aromaticum</i> | 227 |
| Cucumis | <i>Colocynthis</i> | 237 |
| | <i>prophetarum</i> | 238 |
| Cycas | <i>circinalis</i> | 252 |
| Cyclamen | <i>europaeum</i> | 17 |
| Cynanchum | <i>viminale</i> | 68 |
| | <i>monspeliacum</i> | 69 |
| | <i>erectum</i> | 70 |
| Daphne | <i>Mezereum</i> | 108 |
| | <i>Thymelaea</i> | 109 |
| | <i>Tortoni-raira</i> | 110 |
| | <i>alpina</i> | 111 |
| | <i>Laureola</i> | 112 |

| | | |
|-------------|-----------------------|-----|
| Daphne | <i>pontica</i> | 113 |
| | <i>Cneorum</i> | 114 |
| | <i>Gnidium</i> | 115 |
| Datura | <i>ferox</i> | 130 |
| | <i>Stramonium</i> | 31 |
| | <i>Metel</i> | 32 |
| Delphinium | <i>Staphisagria</i> | 165 |
| Digitalis | <i>purpurea</i> | 199 |
| | <i>lutea</i> | 200 |
| Doliocarpus | <i>volubilis</i> | 162 |
| | <i>strictus</i> | 163 |
| Dracontium | <i>foetidum</i> | 224 |
| Drosera | <i>rotundifolia</i> | 98 |
| | <i>longifolia</i> | 99 |
| Echites | <i>suberecta</i> | 65 |
| Euonymus | <i>europaeus</i> | 59 |
| Eupatorium | <i>fastidiosum</i> | 208 |
| Euphorbia | <i>antiquorum</i> | 131 |
| | <i>canariensis</i> | 132 |
| | <i>officinarum</i> | 133 |
| | <i>neriifolia</i> | 134 |
| | <i>mauritanica</i> | 135 |
| | <i>Tirucalli</i> | 136 |
| | <i>rithymalooides</i> | 137 |
| | <i>Peplus</i> | 138 |
| | <i>exigua</i> | 139 |
| | <i>Lathyrus</i> | 140 |
| | <i>helioscopia</i> | 141 |
| | <i>ferrata</i> | 142 |
| | <i>platiphyllus</i> | 143 |
| | <i>Esula</i> | 144 |
| | <i>Cyparissias</i> | 145 |
| | <i>Myrsinites</i> | 146 |
| | <i>palustris</i> | 147 |
| | <i>biberna</i> | 148 |
| | <i>amygdaloides</i> | 149 |
| | <i>sylvatica</i> | 150 |
| | <i>Characias</i> | 151 |
| Excoecaria | <i>Agallocha</i> | 240 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| F agus <i>sylvatica</i> | 225 |
| F icus <i>toxicaria</i> | 250 |
| <i>grossularioides</i> | 251 |
| F ritillaria <i>imperialis</i> | 101 |
| F rutex <i>excoecans</i> | 217 |
| <i>brasiliensis baccifer</i> | 281 |
| F ungi non systematici (| 270 |
| (| 271 |
| G lobularia <i>Alypum</i> | 12 |
| G loiosa <i>superba</i> | 102 |
| G atiola <i>officinalis</i> | I |
| G uarea <i>trichilioides</i> | 107 |
| G uilandia <i>Moringa</i> | 121 |
| H elleborus <i>niger</i> | 197 |
| <i>foetidus</i> | 198 |
| H ippomane <i>Mancinella</i> | 232 |
| <i>biglandulosa</i> | 233 |
| <i>dioica</i> | 234 |
| H ura <i>crepitans</i> | 235 |
| H ydrocotyle <i>vulgare</i> | 75 |
| H yoisycamus <i>niger</i> | 33 |
| <i>albus</i> | 34 |
| <i>muricus</i> | 35 |
| <i>physoloides</i> | 36 |
| <i>Scopolia</i> | 37 |
| H ypecoum <i>procumbens</i> | 15 |
| <i>pendulum</i> | 16 |
| H ypericum <i>bacciferum</i> | 205 |
| I atropha <i>Curcas</i> | 228 |
| <i>multifida</i> | 229 |
| <i>Manihot acris</i> | 230 |
| I atrops <i>umbellata</i> | 274 |
| I gnatia <i>amara</i> | 54 |
| I ris <i>germanica</i> | 5 |
| <i>Pseud' Acorus</i> | 6 |
| <i>foetida</i> | 7 |
| <i>virginica</i> | 8 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| K almia <i>latifolia</i> | 123 |
| <i>angustifolia</i> | 124 |
| L actuca <i>Scariola</i> | 206 |
| <i>virosa</i> | 207 |
| <i>Laurifolia</i> | 287 |
| <i>Lecythis minor</i> | 161 |
| <i>Ledum palustre</i> | 125 |
| <i>Lisianthus Cheloneoides</i> | 20 |
| <i>Lobelia Tupa</i> | 209 |
| <i>longiflora</i> | 210 |
| <i>Cardinalis</i> | 211 |
| <i>orens</i> | 212 |
| <i>Lolium temulentum</i> | 10 |
| <i>Lycoperdon Bonista</i> | 268 |
| <i>stellatum</i> | 269 |
| M elia <i>Acetarach</i> | 122 |
| <i>Menispermum Cocculus</i> | 244 |
| <i>Mercurialis perennis</i> | 245 |
| <i>Mimosa sensitiva</i> | 248 |
| <i>farneſiana</i> | 249 |
| <i>Momordica Elaterium</i> | 236 |
| <i>Myristica fatua</i> | 159 |
| N erium <i>Oleander</i> | 64 |
| N icotiana <i>Tabacum</i> | 38 |
| <i>fruticosa</i> | 39 |
| <i>rustica</i> | 40 |
| <i>paniculata</i> | 41 |
| <i>viscosa</i> | 42 |
| O enanthe <i>fistulosa</i> | 79 |
| <i>crocata</i> | 80 |
| P apauer <i>somniferum</i> | 157 |
| <i>Passerina hirsuta</i> | 116 |
| <i>ciliata</i> | 117 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| <i>Phalaris arundinacea</i> | 9 |
| <i>Phallus impudicus</i> | 266 |
| <i>Mukufin</i> | 267 |
| <i>Phellandrium aquaticum</i> | 81 |
| <i>Physalis somnifera</i> | 45 |
| <i>Phytolacca decandra</i> | 129 |
| <i>Piper latifolium</i> | 2 |
| <i>Plumbago europaea</i> | 22 |
| <i>zeylanica</i> | 23 |
| <i>rosea</i> | 24 |
| <i>Plumeria rubra</i> | 66 |
| <i>Possira arborescens</i> | 247 |
| <i>Prunifera Malabarica</i> | 280 |
| <i>Prunus Laurocerasus</i> | 152 |
| R <i>anunculus flammula</i> | 181 |
| <i>reptans</i> | 182 |
| <i>lingua</i> | 183 |
| <i>gramineus</i> | 184 |
| <i>Ficaria</i> | 185 |
| <i>Thoia</i> | 186 |
| <i>abortivus</i> | 187 |
| <i>sceleratus</i> | 188 |
| <i>sibiricus</i> | 189 |
| <i>alpestris</i> | 190 |
| <i>bulbosus</i> | 191 |
| <i>polyanthemus</i> | 192 |
| <i>acris</i> | 193 |
| <i>aruenfis</i> | 194 |
| <i>muricatus</i> | 195 |
| <i>aquaticus</i> | 196 |
| <i>Rauwolfia canescens</i> | 60 |
| <i>Rhododendron ferrugineum</i> | 126 |
| <i>chrysanthum</i> | 127 |
| <i>ponticum</i> | 128 |
| <i>Rhus Vernix</i> | 93 |
| <i>radicans</i> | 94 |
| <i>Toxicodendron</i> | 95 |
| <i>Ricinus communis</i> | 231 |

| | |
|--|-----|
| <i>Santalum album</i> | 14 |
| <i>Scilla maritima</i> | 103 |
| <i>Secale cereale (hybernum)</i> | 11 |
| <i>Semecarpus Anacardium</i> | 92 |
| <i>Sida asiatica</i> | 202 |
| <i>Sium latifolium</i> | 78 |
| <i>Solanum Dulcamara</i> | 46 |
| <i>nigrum</i> | 47 |
| <i>Mammosum</i> | 48 |
| <i>sodomaeum</i> | 49 |
| <i>foetidum</i> | 50 |
| <i>Spigelia anthelmia</i> | 18 |
| <i>marilandica</i> | 19 |
| <i>Stramonium Luzonis primum</i> | 288 |
| <i>alterum</i> | 289 |
| <i>Strychnos Nux-vomica</i> | 52 |
| <i>colubrina</i> | 53 |
| T abernemontana <i>citrifolia</i> | 67 |
| <i>Tangaraea I.</i> | 283 |
| III. | 284 |
| <i>Taxus baccata</i> | 245 |
| <i>Thapsia foetida</i> | 89 |
| <i>Asclepium</i> | 90 |
| <i>garganica</i> | 91 |
| <i>Caesulpina</i> | 278 |
| <i>Thea Bohea</i> | 164 |
| <i>Toxicaria americana</i> | 13 |
| U pa | 277 |
| V eratrum <i>album</i> | 246 |
| <i>Viburnum Tinus</i> | 96 |
| <i>Cassinaides</i> | 97 |

INDEX SUSPECTORVM.

Secundum numerum pagin.

| | |
|--|-----|
| A | |
| <i>Adamboe</i> | |
| <i>Adonis vernalis</i> | 119 |
| <i>Allium sativum</i> | 77 |
| <i>Amaryllis farniensis</i> | ib. |
| <i>Amyris toxifera</i> | 83 |
| <i>Anethum graueolens</i> | 71 |
| <i>Anthericum ossifragum, aloides</i> | 80 |
| <i>Anthrithinum Cymbalar. minus, Orontium.</i> | 128 |
| <i>Apium Petroselinum</i> | 71 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | 115 |
| <i>Argemone mexicana</i> | 108 |
| <i>Aristolochia Anguicida</i> | 143 |
| <i>Artemisia Absinthium</i> | 139 |
| <i>Arundo Bambus</i> | 27 |
| <i>Asarum canadense</i> | 95 |
| <i>Asphodelus fistulosus</i> | 79 |
| <i>Astrantia maior</i> | 61 |
| <i>Atriplex hortensis</i> | 163 |
| B | |
| <i>Bignonia crucigera, radicata</i> | 128 |
| <i>frutescens</i> | 95 |
| <i>Bocconia Harmala</i> | 96 |
| <i>Boletus luteus</i> | 170 |
| <i>Bromelia Ananas</i> | 76 |
| <i>Bulbus liliaceus</i> | 181 |
| <i>Buxus semperuirens</i> | 148 |
| C | |
| <i>Cachrys odontalgica</i> | 63 |
| <i>Caltha palustris</i> | 126 |
| <i>Cameraria angustifolia</i> | 17 |
| <i>Carlina acaulis</i> | 139 |
| <i>Caryota vrens</i> | 174 |
| <i>Cassine Peragua</i> | 75 |
| <i>Chaerophyllum temulentum</i> | 68 |
| <i>Cimicifuga foetida</i> | 115 |
| <i>Coccoloba emetica</i> | 87 |
| <i>Cocos nucifera</i> | 174 |

Como-

| | |
|---------------------------------------|-----|
| <i>Comocladia dentata</i> | 22 |
| <i>Craube maritima</i> | 130 |
| <i>Croton tinctorium</i> | 148 |
| <i>lacciferum</i> | 150 |
| <i>Crinum asiaticum</i> | 77 |
| <i>Cucumis Madaeraspatanus</i> | 155 |
| <i>Cynoglossum officinale</i> | 33 |
| <i>Cynometra ramiflora</i> | 90 |
| <i>Cynolurus cristatus, echinatus</i> | 26 |
| <i>Cytisus Laburni</i> | 136 |

| | |
|--|-----|
| D <i>ioscorea triphylla</i> | 156 |
| <i>Dolichos unguiculatus, ensiformis</i> | 134 |
| <i>Doronicum Pardalianches</i> | 159 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| E <i>rigeron viscosum</i> | 139 |
| <i>Eruum Erutia</i> | 135 |
| <i>Erysimum officinale</i> | 129 |
| <i>Euphorbia Ipecacuanhae</i> | 99 |
| <i>Apios</i> | 100 |

| | |
|--|-----|
| F <i>icus Carica, Sycomorus</i> | 164 |
| <i>Fritillaria Meleagris</i> | 78 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| G <i>ladiolus communis</i> | 24 |
| <i>Gloriosa simplex</i> | 78 |
| <i>Gumira litorea</i> | 183 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| H <i>eliotropium europaeum</i> | 33 |
| <i>Helleborus hyemalis, viridis</i> | 125 |
| <i>Hydnum repandum</i> | 170 |
| <i>Hyoscyamus aureus</i> | 40 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| I <i>atropha gossypifolia</i> | 150 |
| <i>Iatrops myristicoides</i> | 183 |
| <i>Icthyocenes litorea</i> | ib. |
| <i>montana</i> | 184 |
| <i>Impatiens Nolitangere</i> | 142 |
| <i>Juglans regia</i> | 148 |
| <i>Juniperus Sabina</i> | 159 |

| | |
|--|-----|
| Katou - Theca - Maruara | 182 |
| Lathyrus <i>Cicera, sativus</i> | 135 |
| Leucoium <i>vernale</i> | 76 |
| Ligusticum <i>peleponense</i> | 63 |
| Limonia <i>acidissima</i> | 91 |
| Lobelia <i>Syphylitica</i> | 141 |
| Lonicera <i>Xylosteum</i> | 38 |
| Melothria <i>pendula</i> | 23 |
| Mimosa <i>pudica</i> | 163 |
| Narcissus <i>poeticus, Pseudo - Narc. Tazetta, Ionquilla</i> | 76 |
| <i>Nihun</i> | 176 |
| Nigella <i>damaescena, sativa, aruensis</i> | 115 |
| Orontium <i>aquaticum</i> | 80 |
| Pancratium <i>zeilanicum</i> | 76 |
| <i>maritimum</i> | 78 |
| Paris <i>quadrifolia</i> | 87 |
| Poeonia <i>officinalis</i> | 111 |
| Pedicularis <i>palustris</i> | 128 |
| Penou - Sabfou | 182 |
| Periploca <i>Secamone</i> | 58 |
| Peziza <i>auriculata</i> | 171 |
| Phaca <i>baetica</i> | 136 |
| Phoenix <i>dactylifera, Sagueer</i> | 174 |
| Piper <i>geniculatum</i> | 21 |
| Pimpinella <i>Anisum</i> | 71 |
| Pistacia <i>Strathiotis</i> | 143 |
| Plantago <i>Cynops</i> | 30 |
| Podophyllum <i>peltatum</i> | 106 |
| Poinciana <i>pulcherrima</i> | 90 |
| Polygonum <i>Hydropiper</i> | 86 |
| Pomum <i>Herocchonteum</i> | 284 |
| Psychotria <i>emetica</i> | 38 |
| Ranunculus <i>platanifolius, asiaticus</i> | 122 |
| Raphanus <i>Raphanistrum</i> | 129 |

| | |
|---|-----|
| Rumphia <i>amboinensis</i> | 22 |
| S aluia <i>Horminum</i> | 20 |
| <i>pratensis, glutinosa, Sclarea</i> | 21 |
| Sambucus <i>nigra, racemosa</i> | 75 |
| Scandix <i>Anthriscus</i> | 68 |
| Serapias <i>latifolia</i> | 143 |
| Seseli <i>tortuosum</i> | 69 |
| Sinapis <i>nigra</i> | 129 |
| Solanum <i>Lycopersicum, nigrum</i> | 48 |
| Spartium <i>purgans</i> | 134 |
| T hapfia <i>maxima</i> | 69 |
| <i>villosa</i> | 70 |
| Trichilia <i>trifoliata</i> | 90 |
| Trollius <i>europaeus</i> | 124 |
| V eratrum <i>nigrum, luteum, Sabadilla</i> | 162 |
| Viola <i>parviflora</i> | 141 |

F I N I S.

